

PROGRAMA INTEGRAL PARA EL CONTROL DEL CÁNCER EN CUBA

Anuario de Incidencia de Cáncer en Cuba

2008



Organización
Panamericana
de la Salud

Tablas

Tabla 1: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cuba, 2008*

Tabla 2: Incidencia de cáncer en menores de 20 años según grupos diagnósticos y edad. Ambos sexos. Cuba, 2008*

Tabla 3: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15 años y más y 60 años y más. Cuba, 2008*

Tabla 4: Incidencia de cáncer. Número de casos, tasas crudas y ajustadas según sexo y localización. Cuba, 2008*

Tabla 5: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Pinar del Río, 2008*

Tabla 6: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Pinar del Río, 2008*

Tabla 7: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Pinar del Río, 2008*

Tabla 8: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Artemisa, 2008*

Tabla 9: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Artemisa 2008*

Tabla 10: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Artemisa, 2008*

Tabla 11: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Mayabeque, 2008*

Tabla 12: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Mayabeque 2008*

Tabla 13: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Mayabeque, 2008*

Tabla 14: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. La Habana, 2008*

Tabla 15: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. La Habana, 2008*

Tabla 16: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. La Habana, 2008*

Tabla 17: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Matanzas, 2008*

Tabla 18: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Matanzas, 2008*

Tabla 19: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Matanzas, 2008*

Tabla 20: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Villa Clara, 2008*

Tabla 21: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Villa Clara, 2008*

Tabla 22: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Villa Clara, 2008*

Tabla 23: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cienfuegos, 2008*

Tabla 24: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Cienfuegos, 2008*

Tabla 25: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cienfuegos, 2008*

Tabla 26: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y

ajustadas. Sancti Spíritus, 2008*

Tabla 27: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Sancti Spíritus, 2008*

Tabla 28: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Sancti Spíritus, 2008*

Tabla 29: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Ciego de Ávila, 2008*

Tabla 30 Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Ciego de Ávila, 2008*

Tabla 31: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Ciego de Ávila, 2008*

Tabla 32: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Camagüey, 2008*

Tabla 33: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Camagüey 2008*

Tabla 34: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Camagüey, 2008*

Tabla 35: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Las Tunas, 2008*

Tabla 36: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Las Tunas, 2008*

Tabla 37: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Las Tunas, 2008*

Tabla 38: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Holguín, 2008*

Tabla 39: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Holguín, 2008*

Tabla 40: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Holguín, 2008*

Tabla 41: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Granma, 2008*

Tabla 42: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Granma, 2008*

Tabla 43: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Granma, 2008*

Tabla 44: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Santiago de Cuba, 2008*

Tabla 45: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Santiago de Cuba, 2008*

Tabla 46: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Santiago de Cuba, 2008*

Tabla 47: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Guantánamo, 2008*

Tabla 48: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Guantánamo, 2008*

Tabla 49: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Guantánamo, 2008*

Tabla 50: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Isla de la Juventud, 2008*

Tabla 51: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Isla de la Juventud, 2008*

Tabla 52: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Isla de la Juventud, 2008*

Calidad de los datos

Tabla 53: Indicadores de calidad por provincias. Cuba 2008

Pronósticos

Tabla 54: Pronósticos de las principales localizaciones de Incidencia de Cáncer según sexo. Cuba2012

Anexos

Suplemento con la distribución espacio temporal de la Incidencia de cáncer en Cuba.

Tabla 1: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cuba, 2008*

| Masculino | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C44 | Piel | 3346 | 59.5 | 40.1 |
| C61 | Glándula prostática | 2562 | 45.5 | 26.7 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 2554 | 45.4 | 30.8 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 788 | 14.0 | 10.1 |
| C32 | Laringe | 769 | 13.7 | 10.0 |
| C18 | Colon | 750 | 13.3 | 8.7 |
| C67 | Vejiga urinaria | 590 | 10.5 | 6.9 |
| 959-964 | Linfomas | 435 | 7.7 | 6.1 |
| C16 | Estomago | 422 | 7.5 | 5.1 |
| C15 | Esófago | 397 | 7.1 | 5.0 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 15436 | 274.3 | 185.8 |

| Femenino | | | | |
|----------|--------------------------|-------|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C50 | Mama | 2951 | 52.6 | 34.8 |
| C44 | Piel | 2826 | 50.4 | 31.5 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 1397 | 24.9 | 15.8 |
| C53 | Cuello uterino | 1271 | 22.6 | 15.6 |
| C18 | Colon | 960 | 17.1 | 9.6 |
| C54 | Cuerpo uterino | 502 | 8.9 | 6.1 |
| C56 | Ovario | 395 | 7.0 | 5.0 |
| C73 | Glándula tiroides | 372 | 6.6 | 5.0 |
| 959-964 | Linfomas | 329 | 5.9 | 4.3 |
| 980-994 | Leucemias | 310 | 5.5 | 4.2 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 14555 | 259.4 | 168.4 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes.

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 2: Incidencia de cáncer en menores de 20 años según grupos diagnósticos y edad. Ambos sexos. Cuba, 2008*

| GRUPOS DIAGNÓSTICO | menor de 1 año | | 1-4 | | 5-9 | | 10-14 | | 15-19 | | 0-14 | | 0-19 | | |
|--|----------------|------|-----|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| | No. | t.e. | No. | t.e. | No. | t.e. | No. | t.e. | No. | t.e. | No. | t.e. | No. | t.e. | t.a.m |
| Leucemias total | 4 | 35.8 | 28 | 57.2 | 20 | 28.3 | 19 | 26.8 | 18 | 21.3 | 71 | 35.2 | 89 | 31.1 | 33.8 |
| - linfoides | 0 | 0.0 | 18 | 36.8 | 8 | 11.3 | 10 | 14.1 | 4 | 4.7 | 36 | 17.8 | 40 | 14.0 | 15.9 |
| - agudas no linfocíticas | 0 | 0.0 | 4 | 8.2 | 6 | 8.5 | 4 | 5.6 | 7 | 8.3 | 14 | 6.9 | 21 | 7.3 | 7.2 |
| - mieloides crónicas | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| - no especificadas | 4 | 35.8 | 6 | 12.3 | 6 | 8.5 | 5 | 7.0 | 6 | 7.1 | 21 | 10.4 | 27 | 9.4 | 10.4 |
| Linfomas total | 0 | 0.0 | 8 | 16.3 | 10 | 14.1 | 14 | 19.7 | 18 | 21.3 | 32 | 15.8 | 50 | 17.5 | 16.7 |
| - Linfomas Hodgkin | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 2 | 2.8 | 5 | 7.0 | 8 | 9.5 | 8 | 4.0 | 16 | 5.6 | 4.9 |
| - Linfomas no Hodgkin | 0 | 0.0 | 6 | 12.3 | 8 | 11.3 | 8 | 11.3 | 9 | 10.6 | 22 | 10.9 | 31 | 10.8 | 10.7 |
| - no especificados | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 2 | 1.0 | 3 | 1.0 | 1.1 |
| Sistema Nervioso Central | 0 | 0.0 | 13 | 26.6 | 15 | 21.2 | 14 | 19.7 | 10 | 11.8 | 42 | 20.8 | 52 | 18.2 | 18.8 |
| - endimoma | 0 | 0.0 | 2 | 4.1 | 2 | 2.8 | 2 | 2.8 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 6 | 2.1 | 2.3 |
| - astrocitoma | 0 | 0.0 | 3 | 6.1 | 4 | 5.7 | 6 | 8.4 | 3 | 3.5 | 13 | 6.4 | 16 | 5.6 | 5.6 |
| - otros gliomas | 0 | 0.0 | 3 | 6.1 | 1 | 1.4 | 5 | 7.0 | 2 | 2.4 | 9 | 4.5 | 11 | 3.8 | 3.9 |
| - Sistema nervioso central sin especificar | 0 | 0.0 | 5 | 10.2 | 8 | 11.3 | 1 | 1.4 | 5 | 5.9 | 14 | 6.9 | 19 | 6.6 | 6.9 |
| Sistema Nervioso Simpático | 1 | 8.9 | 8 | 16.3 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 11 | 5.4 | 12 | 4.2 | 5.4 |
| - neuroblastomas | 1 | 8.9 | 7 | 14.3 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 10 | 5.0 | 11 | 3.8 | 4.9 |
| - ganglioneuroblastomas | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| Retinoblastomas | 0 | 0.0 | 4 | 8.2 | 0 | 0.0 | 2 | 2.8 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 6 | 2.1 | 2.6 |
| Tumores renales | 0 | 0.0 | 9 | 18.4 | 2 | 2.8 | 2 | 2.8 | 4 | 4.7 | 13 | 6.4 | 17 | 5.9 | 6.8 |
| - tumor de wilms | 0 | 0.0 | 3 | 6.1 | 2 | 2.8 | 0 | 0.0 | 1 | 1.2 | 5 | 2.5 | 6 | 2.1 | 2.4 |
| - otros no especificados | 0 | 0.0 | 6 | 12.3 | 0 | 0.0 | 2 | 2.8 | 3 | 3.5 | 8 | 4.0 | 11 | 3.8 | 4.4 |
| Tumores hepáticos | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| - hepatoblastomas | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| Tumores óseos | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 1 | 1.4 | 7 | 9.9 | 3 | 3.5 | 9 | 4.5 | 12 | 4.2 | 3.8 |
| - osteosarcomas | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 5.6 | 3 | 3.5 | 4 | 2.0 | 7 | 2.4 | 2.0 |
| - sarcoma de ewing | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.7 | 0.7 |
| - otros no especificados | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.8 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 | 3 | 1.0 | 1.1 |
| Sarcomas tejidos blandos | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 2 | 2.4 | 1 | 0.5 | 3 | 1.0 | 0.9 |
| - otros especificados | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 2 | 2.4 | 1 | 0.5 | 3 | 1.0 | 0.9 |
| Tumor de células germinales | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 4 | 1.4 | 1.5 |
| - germinales no especificados | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 4 | 1.4 | 1.5 |
| Carcinomas y otros epiteliales | 0 | 0.0 | 2 | 4.1 | 2 | 2.8 | 1 | 1.4 | 22 | 26.0 | 5 | 2.5 | 27 | 9.4 | 7.8 |
| - melanoma | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| - carcinomas de piel | 0 | 0.0 | 2 | 4.1 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 7 | 8.3 | 4 | 2.0 | 11 | 3.8 | 3.5 |
| - carcinoma de tiroides | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 14.2 | 0 | 0.0 | 12 | 4.2 | 3.2 |
| - carcinoma nasofaríngeo | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 0 | 0.0 | 2 | 2.4 | 1 | 0.5 | 3 | 1.0 | 0.9 |
| Otras neoplasias no específicas | 0 | 0.0 | 20 | 40.8 | 9 | 12.7 | 11 | 15.5 | 25 | 29.6 | 40 | 19.8 | 65 | 22.7 | 23.1 |
| Todas las localizaciones | 5 | 44.7 | 95 | 194.0 | 61 | 86.2 | 74 | 104.2 | 103 | 121.9 | 235 | 116.4 | 338 | 118.0 | 121.7 |

*cifras preliminares

te: tasas específicas por edad por 1000 000

tam: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000

Tabla 3: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Cuba, 2008*

| Masculino | | | | | |
|-----------|--------------------------------|------|-------|----------|--------|
| CIE-03 | Localización | 1559 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C44 | Piel | 1055 | 28.5 | 2283 | 258.5 |
| C61 | Glándula prostática | 166 | 4.5 | 2392 | 270.8 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 574 | 15.5 | 1978 | 224.0 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 345 | 9.3 | 442 | 50.0 |
| C32 | Laringe | 263 | 7.1 | 505 | 57.2 |
| C18 | Colon | 157 | 4.2 | 592 | 67.0 |
| C67 | Vejiga urinaria | 102 | 2.8 | 488 | 55.3 |
| C16 | Estomago | 93 | 2.5 | 327 | 37.0 |
| 959-964 | Linfomas | 203 | 5.5 | 210 | 23.8 |
| C15 | Esófago | 144 | 3.9 | 252 | 28.5 |
| C00C80 | Todas las localizaciones | 4093 | 110.5 | 11187 | 1266.6 |

| Femenino | | | | | |
|----------|--------------------------|------|-------|----------|-------|
| CIE-03 | Localización | 1559 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C50 | Mama | 1419 | 38.9 | 1531 | 156.3 |
| C44 | Piel | 1072 | 29.4 | 1743 | 178.0 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 398 | 10.9 | 999 | 102.0 |
| C53 | Cuello uterino | 923 | 25.3 | 346 | 35.3 |
| C18 | Colon | 177 | 4.8 | 781 | 79.7 |
| C54 | Cuerpo uterino | 168 | 4.6 | 334 | 34.1 |
| C56 | Ovario | 250 | 6.8 | 142 | 14.5 |
| C73 | Glándula tiroides | 292 | 8.0 | 80 | 8.2 |
| 959-964 | Linfomas | 156 | 4.3 | 161 | 16.4 |
| 980-994 | Leucemias | 101 | 2.8 | 182 | 18.6 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 5940 | 162.7 | 8509 | 868.7 |

*cifras preliminares

tasa: tasa especifica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 4: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cuba, 2008*

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C00- C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 255 | 4.5 | 3.0 | 788 | 14.0 | 10.1 |
| C00 | -Labio | 26 | 0.5 | 0.4 | 65 | 1.2 | 0.9 |
| C01 | -Base de la lengua | 14 | 0.2 | 0.2 | 84 | 1.5 | 1.1 |
| C02 | -Otras partes de la lengua | 46 | 0.8 | 0.6 | 98 | 1.7 | 1.3 |
| C03 | -Encía | 8 | 0.1 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0.2 |
| C04 | -Piso de la boca | 7 | 0.1 | 0.1 | 57 | 1.0 | 0.8 |
| C05 | -Paladar | 24 | 0.4 | 0.3 | 47 | 0.8 | 0.7 |
| C06 | -Otras de la boca | 50 | 0.9 | 0.6 | 84 | 1.5 | 1.1 |
| C07 | -Parótida | 16 | 0.3 | 0.3 | 19 | 0.3 | 0.3 |
| C08 | -Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas | 8 | 0.1 | 0.2 | 7 | 0.1 | 0.2 |
| C09 | -Amígdala | 18 | 0.3 | 0.3 | 111 | 2.0 | 1.5 |
| C10 | -Orofaringe | 13 | 0.2 | 0.2 | 55 | 1.0 | 0.8 |
| C11 | -Nasofaringe | 15 | 0.3 | 0.2 | 55 | 1.0 | 0.8 |
| C12 | -Seno periforme | 1 | 0.1 | 0.1 | 7 | 0.1 | 0.2 |
| C13 | -Hipofaringe | 4 | 0.1 | 0.1 | 50 | 0.9 | 0.7 |
| C14 | -Otras cavidad bucal | 5 | 0.1 | 0.1 | 39 | 0.7 | 0.5 |
| C15- C26 | Órganos digestivos | 2357 | 42.0 | 24.5 | 2536 | 45.1 | 30.3 |
| C15 | -Esófago | 109 | 1.9 | 1.2 | 397 | 7.1 | 5.0 |
| C16 | -Estomago | 253 | 4.5 | 2.7 | 422 | 7.5 | 5.1 |
| C17 | -Intestino delgado | 38 | 0.7 | 0.4 | 32 | 0.6 | 0.5 |
| C18 | -Colon | 960 | 17.1 | 9.6 | 750 | 13.3 | 8.7 |
| C19 | -Unión recto-sigmoidea | 23 | 0.4 | 0.3 | 15 | 0.3 | 0.2 |
| C20 | -Recto | 222 | 4.0 | 2.6 | 230 | 4.1 | 2.7 |
| C21 | -Año y conducto anal | 82 | 1.5 | 1.1 | 24 | 0.4 | 0.4 |
| C22 | -Hígado y conducto biliar | 259 | 4.6 | 2.7 | 273 | 4.9 | 3.5 |
| C23 | -Vesícula biliar | 40 | 0.7 | 0.5 | 26 | 0.5 | 0.4 |
| C24 | -Otras partes y las no especificadas de las vías biliares | 82 | 1.5 | 1.0 | 65 | 1.2 | 0.8 |
| C25 | -Páncreas | 280 | 5.0 | 3.0 | 294 | 5.2 | 3.5 |
| C26 | -Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos | 9 | 0.2 | 0.1 | 8 | 0.1 | 0.1 |
| C30- C39 | Sistema respiratorio y órganos intratorácicos | 1650 | 29.4 | 18.9 | 3471 | 61.7 | 42.6 |
| C30 | -Cavidad nasal-oído medio | 27 | 0.5 | 0.4 | 36 | 0.6 | 0.5 |
| C31 | -Senos paranasales | 4 | 0.1 | 0.1 | 20 | 0.4 | 0.3 |
| C32 | -Laringe | 135 | 2.4 | 1.7 | 769 | 13.7 | 10.0 |
| C33 | -Tráquea | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| C34 | -Bronquios y pulmón | 1397 | 24.9 | 15.8 | 2554 | 45.4 | 30.8 |
| C37 | -Timo | 1 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.1 | 0.1 |
| C38 | -Corazón-mediastino-pleura | 33 | 0.6 | 0.5 | 38 | 0.7 | 0.6 |
| C39 | -Otros sistema respiratorio | 52 | 0.9 | 0.6 | 47 | 0.8 | 0.6 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 4: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cuba, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|------------------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C40-C41 | Huesos articulaciones y cartílago articular | 80 | 1.4 | 1.0 | 71 | 1.3 | 1.2 |
| C40 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros | 26 | 0.5 | 0.4 | 28 | 0.5 | 0.6 |
| C41 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados | 54 | 1.0 | 0.7 | 43 | 0.8 | 0.7 |
| 980-994 | Leucemias | 310 | 5.5 | 4.2 | 388 | 6.9 | 5.6 |
| 9800 | Leucemias sin especificar | 6 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.1 |
| 9801 | Agudas sin especificar | 13 | 0.2 | 0.3 | 11 | 0.2 | 0.3 |
| 9800 | Crónicas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9820 | Linfoblásticas sin especificar | 33 | 0.6 | 0.7 | 58 | 1.0 | 1.2 |
| 9821 | Linfoblásticas agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9823 | Linfoblásticas crónicas | 14 | 0.2 | 0.2 | 17 | 0.3 | 0.3 |
| 9860 | Mieloides sin especificar | 29 | 0.5 | 0.4 | 32 | 0.6 | 0.5 |
| 9861 | Mieloides agudas | 16 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0.4 | 0.5 |
| 9863 | Mieloides crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9940-9948 | Otras leucemias | 199 | 3.5 | 2.6 | 242 | 4.3 | 3.1 |
| 9732 | Mielomas | 55 | 1.0 | 0.7 | 52 | 0.9 | 0.7 |
| C44 | Piel | 2826 | 50.4 | 31.5 | 3346 | 59.5 | 40.1 |
| C47 | Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo | 10 | 0.2 | 0.2 | 10 | 0.2 | 0.2 |
| C48 | Peritoneo-retroperitoneo | 48 | 0.9 | 0.7 | 43 | 0.8 | 0.6 |
| C49 | Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos | 20 | 0.4 | 0.3 | 37 | 0.7 | 0.5 |
| C50 | Mama | 2951 | 52.6 | 34.8 | 53 | 0.9 | 0.7 |
| C51-C58 | Órganos genitales femeninos. | 2428 | 43.3 | 29.4 | - | - | - |
| C51 | -Vulva | 66 | 1.2 | 0.8 | - | - | - |
| C52 | -Vagina | 27 | 0.5 | 0.4 | - | - | - |
| C53 | -Cuello uterino | 1271 | 22.6 | 15.6 | - | - | - |
| C54 | -Cuerpo uterino | 502 | 8.9 | 6.1 | - | - | - |
| C55 | -Útero sin especificar | 155 | 2.8 | 1.7 | - | - | - |
| C56 | -Ovario | 395 | 7.0 | 5.0 | - | - | - |
| C57 | -Otros órganos genitales femeninos y los no especificados | 12 | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
| C58 | -Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C60-C63 | Órganos genitales masculinos | - | - | - | 2683 | 47.7 | 28.4 |
| C60 | -Pene | - | - | - | 88 | 1.6 | 1.1 |
| C61 | -Glándula prostática | - | - | - | 2562 | 45.5 | 26.7 |
| C62 | -Testículo | - | - | - | 30 | 0.5 | 0.6 |
| C63 | Órganos genitales masculinos y los no especificados | - | - | - | 3 | 0.1 | 0.1 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 4: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cuba, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C64- C68 | Tracto urinario | 354 | 6.3 | 4.1 | 788 | 14.0 | 9.6 |
| C64 | -Riñón | 117 | 2.1 | 1.5 | 179 | 3.2 | 2.6 |
| C65 | -Pelvis renal | 7 | 0.1 | 0.1 | 7 | 0.1 | 0.2 |
| C66 | -Uréter | 2 | 0.1 | 0.1 | 9 | 0.2 | 0.2 |
| C67 | -Vejiga urinaria | 221 | 3.9 | 2.4 | 590 | 10.5 | 6.9 |
| C68 | -Otros órganos urinarios y los no especificados | 7 | 0.1 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.1 |
| C69- C72 | Encéfalo, ojo, otros SNC | 273 | 4.9 | 3.9 | 329 | 5.8 | 4.6 |
| C69 | -Ojo y anexos | 48 | 0.9 | 0.7 | 77 | 1.4 | 1.1 |
| C70 | -Meninges | 7 | 0.1 | 0.1 | 9 | 0.2 | 0.2 |
| C71 | -Encéfalo | 210 | 3.7 | 3.1 | 238 | 4.2 | 3.4 |
| C72 | -Medula espinal-nervios | 8 | 0.1 | 0.2 | 5 | 0.1 | 0.2 |
| C73- C75 | Tiroides, y otras glándulas endocrinas | 383 | 6.8 | 5.1 | 118 | 2.1 | 1.7 |
| C73 | -Glándula tiroides | 372 | 6.6 | 5.0 | 100 | 1.8 | 1.4 |
| C74 | -Glándula suprarrenal | 8 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0.2 | 0.3 |
| C75 | -Otras glándulas endocrinos | 3 | 0.1 | 0.1 | 7 | 0.1 | 0.2 |
| C76 | Sitios mal definidos | 97 | 1.7 | 1.3 | 131 | 2.3 | 1.7 |
| 959-972 | Linfomas total | 329 | 5.9 | 4.3 | 435 | 7.7 | 6.1 |
| 965-966 | - Linfomas Hodgkin | 56 | 1.0 | 0.9 | 61 | 1.1 | 1.0 |
| 967-972 | - Linfomas no Hodgkin | 155 | 2.8 | 2.1 | 231 | 4.1 | 3.4 |
| 959 | - Otros sin especificar | 118 | 2.1 | 1.4 | 143 | 2.5 | 1.9 |
| C80 | Sitio primario desconocido | 129 | 2.3 | 1.6 | 157 | 2.8 | 2.1 |
| C00- C80 | Todas las localizaciones | 14555 | 259.4 | 168.4 | 15436 | 274.3 | 185.8 |

*cifras preliminares

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 5: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Pinar del Rio, 2008*

| Masculino | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C44 | Piel | 315 | 104.0 | 72.3 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 123 | 40.6 | 28.0 |
| C61 | Glándula prostática | 104 | 34.4 | 20.3 |
| C18 | Colon | 41 | 13.5 | 9.5 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 34 | 11.2 | 7.8 |
| C32 | Laringe | 32 | 10.6 | 7.4 |
| C67 | Vejiga urinaria | 22 | 7.3 | 4.9 |
| C16 | Estomago | 21 | 6.9 | 4.9 |
| 980-994 | Leucemias | 21 | 6.9 | 6.0 |
| 959-964 | Linfomas | 19 | 6.3 | 4.5 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 881 | 291.0 | 199.5 |

| Femenino | | | | |
|----------|--------------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C44 | Piel | 189 | 64.8 | 43.4 |
| C50 | Mama | 144 | 49.3 | 33.9 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 89 | 30.5 | 20.7 |
| C53 | Cuello uterino | 65 | 22.3 | 16.1 |
| C18 | Colon | 36 | 12.3 | 7.1 |
| C73 | Glándula tiroides | 33 | 11.3 | 9.1 |
| C54 | Cuerpo uterino | 29 | 9.9 | 6.6 |
| 980-994 | Leucemias | 19 | 6.5 | 6.3 |
| C56 | Ovario | 16 | 5.5 | 4.3 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 14 | 4.8 | 3.5 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 789 | 270.4 | 186.5 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 6: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Pinar del Río, 2008*

| Masculino | | | | | |
|-----------|--------------------------------|------|-------|----------|--------|
| CIE-03 | Localización | 1559 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C44 | Piel | 96 | 50.9 | 219 | 455.1 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 29 | 15.4 | 94 | 195.4 |
| C18 | Colon | 16 | 8.5 | 25 | 52.0 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 13 | 6.9 | 21 | 43.6 |
| C32 | Laringe | 9 | 4.8 | 23 | 47.8 |
| 980-994 | Leucemias | 7 | 3.7 | 11 | 22.9 |
| C73 | Glándula tiroides | 7 | 3.7 | 1 | 2.1 |
| C71 | Encéfalo | 6 | 3.2 | 9 | 18.7 |
| C69 | Ojo y anexos | 6 | 3.2 | 1 | 2.1 |
| C16 | Estomago | 6 | 3.2 | 15 | 31.2 |
| C00C80 | Todas las localizaciones | 243 | 128.9 | 632 | 1313.5 |

| Femenino | | | | | |
|----------|--------------------------------|------|-------|----------|-------|
| CIE-03 | Localización | 1559 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C44 | Piel | 89 | 46.7 | 100 | 208.9 |
| C50 | Mama | 80 | 42.0 | 64 | 133.7 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 26 | 13.7 | 63 | 131.6 |
| C53 | Cuello uterino | 48 | 25.2 | 17 | 35.5 |
| C18 | Colon | 6 | 3.2 | 30 | 62.7 |
| C73 | Glándula tiroides | 29 | 15.2 | 4 | 8.4 |
| C54 | Cuerpo uterino | 14 | 7.4 | 15 | 31.3 |
| C56 | Ovario | 12 | 6.3 | 4 | 8.4 |
| 980-994 | Leucemias | 7 | 3.7 | 8 | 16.7 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 6 | 3.2 | 8 | 16.7 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 370 | 194.3 | 412 | 860.6 |

*cifras preliminares

tasa: tasa especifica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 7: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Pinar del Río, 2008*

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C00- C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 14 | 4.8 | 3.5 | 34 | 11.2 | 7.8 |
| C00 | -Labio | 1 | 0.3 | 0.3 | 6 | 2.0 | 1.6 |
| C01 | -Base de la lengua | 2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C02 | -Otras partes de la lengua | 1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.3 | 1.0 |
| C03 | -Encía | 1 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0.2 |
| C04 | -Piso de la boca | 1 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0.6 |
| C05 | -Paladar | 1 | 0.3 | 0.2 | 3 | 1.0 | 0.8 |
| C06 | -Otras de la boca | 1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.3 | 1.0 |
| C07 | -Parótida | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C08 | -Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C09 | -Amígdala | 2 | 0.7 | 0.6 | 8 | 2.6 | 1.9 |
| C10 | -Orofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C11 | -Nasofaringe | 2 | 0.7 | 0.5 | 3 | 1.0 | 0.7 |
| C12 | -Seno periforme | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C13 | -Hipofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C14 | -Otras cavidad bucal | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C15- C26 | Órganos digestivos | 94 | 32.2 | 19.7 | 124 | 41.0 | 28.4 |
| C15 | -Esófago | 3 | 1.0 | 0.7 | 7 | 2.3 | 1.5 |
| C16 | -Estomago | 9 | 3.1 | 2.3 | 21 | 6.9 | 4.9 |
| C17 | -Intestino delgado | 4 | 1.4 | 1.0 | 4 | 1.3 | 0.9 |
| C18 | -Colon | 36 | 12.3 | 7.1 | 41 | 13.5 | 9.5 |
| C19 | -Unión recto-sigmoidea | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C20 | -Recto | 10 | 3.4 | 2.5 | 17 | 5.6 | 4.2 |
| C21 | -Año y conducto anal | 1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C22 | -Hígado y conducto biliar | 14 | 4.8 | 2.6 | 12 | 4.0 | 3.1 |
| C23 | -Vesícula biliar | 3 | 1.0 | 0.6 | 2 | 0.7 | 0.3 |
| C24 | -Otras partes y las no especificadas de las vías biliares | 2 | 0.7 | 0.5 | 3 | 1.0 | 0.8 |
| C25 | -Páncreas | 10 | 3.4 | 2.4 | 15 | 5.0 | 3.2 |
| C26 | -Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos | 2 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C30- C39 | Sistema respiratorio y órganos intratorácicos | 103 | 35.3 | 24.2 | 165 | 54.5 | 38.2 |
| C30 | -Cavidad nasal-oído medio | 5 | 1.7 | 1.3 | 4 | 1.3 | 1.0 |
| C31 | -Senos paranasales | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 0.8 |
| C32 | -Laringe | 5 | 1.7 | 1.3 | 32 | 10.6 | 7.4 |
| C33 | -Tráquea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C34 | -Bronquios y pulmón | 89 | 30.5 | 20.7 | 123 | 40.6 | 28.0 |
| C37 | -Timo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C38 | -Corazón-mediastino-pleura | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.7 |
| C39 | -Otros sistema respiratorio | 3 | 1.0 | 0.9 | 2 | 0.7 | 0.5 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 7: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Pinar del Río, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|------------------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C40-C41 | Huesos articulaciones y cartílago articular | 3 | 1.0 | 0.6 | 3 | 1.0 | 0.8 |
| C40 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C41 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados | 2 | 0.7 | 0.4 | 3 | 1.0 | 0.8 |
| 980-994 | Leucemias | 19 | 6.5 | 6.3 | 21 | 6.9 | 6.0 |
| 9800 | Leucemias sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 9801 | Agudas sin especificar | 1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9800 | Crónicas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9820 | Linfoblásticas sin especificar | 2 | 0.7 | 0.9 | 4 | 1.3 | 1.9 |
| 9821 | Linfoblásticas agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9823 | Linfoblásticas crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9860 | Mieloides sin especificar | 2 | 0.7 | 0.5 | 2 | 0.7 | 0.6 |
| 9861 | Mieloides agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9863 | Mieloides crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9940-9948 | Otras leucemias | 14 | 4.8 | 4.6 | 14 | 4.6 | 3.3 |
| 9732 | Mielomas | 2 | 0.7 | 0.5 | 3 | 1.0 | 0.7 |
| C44 | Piel | 189 | 64.8 | 43.4 | 315 | 104.0 | 72.3 |
| C47 | Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.2 |
| C48 | Peritoneo-retroperitoneo | 2 | 0.7 | 0.6 | 2 | 0.7 | 0.4 |
| C49 | Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos | 3 | 1.0 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C50 | Mama | 144 | 49.3 | 33.9 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C51-C58 | Órganos genitales femeninos. | 127 | 43.5 | 30.7 | - | - | - |
| C51 | -Vulva | 4 | 1.4 | 0.8 | - | - | - |
| C52 | -Vagina | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C53 | -Cuello uterino | 65 | 22.3 | 16.1 | - | - | - |
| C54 | -Cuerpo uterino | 29 | 9.9 | 6.6 | - | - | - |
| C55 | -Útero sin especificar | 13 | 4.5 | 3.3 | - | - | - |
| C56 | -Ovario | 16 | 5.5 | 4.3 | - | - | - |
| C57 | -Otros órganos genitales femeninos y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C58 | -Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C60-C63 | Órganos genitales masculinos | - | - | - | 109 | 36.0 | 21.4 |
| C60 | -Pene | - | - | - | 4 | 1.3 | 0.9 |
| C61 | -Glándula prostática | - | - | - | 104 | 34.4 | 20.3 |
| C62 | -Testículo | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C63 | Órganos genitales masculinos y los no especificados | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 7: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Pinar del Río, 2008* (continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C64- C68 | Tracto urinario | 19 | 6.5 | 5.0 | 29 | 9.6 | 6.7 |
| C64 | -Riñón | 6 | 2.1 | 1.7 | 5 | 1.7 | 1.3 |
| C65 | -Pelvis renal | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C66 | -Uréter | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C67 | -Vejiga urinaria | 12 | 4.1 | 3.1 | 22 | 7.3 | 4.9 |
| C68 | -Otros órganos urinarios y los no especificados | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C69- C72 | Encéfalo, ojo, otros SNC | 16 | 5.5 | 4.5 | 23 | 7.6 | 5.4 |
| C69 | -Ojo y anexos | 4 | 1.4 | 1.1 | 7 | 2.3 | 1.5 |
| C70 | -Meninges | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C71 | -Encéfalo | 12 | 4.1 | 3.4 | 16 | 5.3 | 4.0 |
| C72 | -Medula espinal-nervios | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C73- C75 | Tiroides, y otras glándulas endocrinas | 33 | 11.3 | 9.1 | 9 | 3.0 | 2.0 |
| C73 | -Glándula tiroides | 33 | 11.3 | 9.1 | 8 | 2.6 | 1.8 |
| C74 | -Glándula suprarrenal | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C75 | -Otras glándulas endocrinos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C76 | Sitios mal definidos | 2 | 0.7 | 0.4 | 10 | 3.3 | 2.3 |
| 959-972 | Linfomas total | 7 | 2.4 | 2.0 | 19 | 6.3 | 4.5 |
| 965-966 | - Linfomas Hodgkin | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 967-972 | - Linfomas no Hodgkin | 3 | 1.0 | 1.2 | 15 | 5.0 | 3.6 |
| 959 | - Otros sin especificar | 4 | 1.4 | 0.8 | 3 | 1.0 | 0.7 |
| C80 | Sitio primario desconocido | 12 | 4.1 | 2.4 | 13 | 4.3 | 3.2 |
| C00- C80 | Todas las localizaciones | 789 | 270.4 | 186.5 | 881 | 291.0 | 199.5 |

*cifras preliminares

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 8: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Artemisa, 2008*

| Masculino | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C44 | Piel | 143 | 56.6 | 40.3 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 135 | 53.4 | 39.0 |
| C61 | Glándula prostática | 109 | 43.1 | 28.2 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 41 | 16.2 | 11.9 |
| C18 | Colon | 36 | 14.3 | 9.8 |
| C67 | Vejiga urinaria | 34 | 13.5 | 9.9 |
| C32 | Laringe | 27 | 10.7 | 7.9 |
| C15 | Esófago | 22 | 8.7 | 6.4 |
| 959-964 | Linfomas | 21 | 8.3 | 7.2 |
| C16 | Estomago | 20 | 7.9 | 5.9 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 686 | 271.5 | 197.3 |

| Femenino | | | | |
|----------|--------------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C50 | Mama | 126 | 51.3 | 38.2 |
| C44 | Piel | 98 | 39.9 | 27.9 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 69 | 28.1 | 19.4 |
| C53 | Cuello uterino | 58 | 23.6 | 16.7 |
| C18 | Colon | 45 | 18.3 | 10.9 |
| C56 | Ovario | 24 | 9.8 | 6.3 |
| C54 | Cuerpo uterino | 21 | 8.5 | 6.5 |
| C73 | Glándula tiroides | 19 | 7.7 | 5.0 |
| 959-964 | Linfomas | 19 | 7.7 | 5.9 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 18 | 7.3 | 5.0 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 630 | 256.5 | 182.6 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 9: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Artemisa, 2008*

| Masculino | | | | | |
|-----------|--------------------------------|------|-------|----------|--------|
| CIE-03 | Localización | 1559 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C44 | Piel | 45 | 26.9 | 98 | 265.3 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 30 | 17.9 | 105 | 284.3 |
| C61 | Glándula prostática | 15 | 9.0 | 94 | 254.5 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 17 | 10.1 | 24 | 65.0 |
| C18 | Colon | 3 | 1.8 | 33 | 89.3 |
| C67 | Vejiga urinaria | 12 | 7.2 | 22 | 59.6 |
| C32 | Laringe | 6 | 3.6 | 21 | 56.9 |
| C15 | Esófago | 8 | 4.8 | 14 | 37.9 |
| C16 | Estomago | 4 | 2.4 | 16 | 43.3 |
| 959-994 | Linfomas | 7 | 4.2 | 11 | 29.8 |
| C00C80 | Todas las localizaciones | 182 | 108.7 | 497 | 1345.6 |

| Femenino | | | | | |
|----------|--------------------------------|------|-------|----------|-------|
| CIE-03 | Localización | 1559 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C50 | Mama | 67 | 41.5 | 59 | 153.1 |
| C44 | Piel | 39 | 24.1 | 58 | 150.5 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 19 | 11.8 | 50 | 129.8 |
| C53 | Cuello uterino | 46 | 28.5 | 12 | 31.1 |
| C18 | Colon | 8 | 5.0 | 37 | 96.0 |
| C56 | Ovario | 12 | 7.4 | 12 | 31.1 |
| C54 | Cuerpo uterino | 5 | 3.1 | 16 | 41.5 |
| C73 | Glándula tiroides | 14 | 8.7 | 5 | 13.0 |
| 959-964 | Linfomas | 8 | 5.0 | 11 | 28.6 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 5 | 3.1 | 13 | 33.7 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 271 | 167.8 | 354 | 918.8 |

*cifras preliminares

tasa: tasa especifica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 10: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Artemisa, 2008*

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C00- C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 18 | 7.3 | 5.0 | 41 | 16.2 | 11.9 |
| C00 | -Labio | 2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.6 | 0.9 |
| C01 | -Base de la lengua | 2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.6 | 1.4 |
| C02 | -Otras partes de la lengua | 4 | 1.6 | 1.1 | 6 | 2.4 | 2.1 |
| C03 | -Encía | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C04 | -Piso de la boca | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 0.6 |
| C05 | -Paladar | 2 | 0.8 | 0.7 | 2 | 0.8 | 0.7 |
| C06 | -Otras de la boca | 4 | 1.6 | 0.8 | 6 | 2.4 | 1.9 |
| C07 | -Parótida | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C08 | -Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.2 |
| C09 | -Amígdala | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2.4 | 1.6 |
| C10 | -Orofaringe | 2 | 0.8 | 0.7 | 7 | 2.8 | 2.1 |
| C11 | -Nasofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C12 | -Seno periforme | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C13 | -Hipofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.3 |
| C14 | -Otras cavidad bucal | 1 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.8 | 0.6 |
| C15- C26 | Órganos digestivos | 97 | 39.5 | 25.4 | 111 | 43.9 | 32.3 |
| C15 | -Esófago | 2 | 0.8 | 0.5 | 22 | 8.7 | 6.4 |
| C16 | -Estomago | 13 | 5.3 | 3.8 | 20 | 7.9 | 5.9 |
| C17 | -Intestino delgado | 1 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.8 | 0.7 |
| C18 | -Colon | 45 | 18.3 | 10.9 | 36 | 14.3 | 9.8 |
| C19 | -Unión recto-sigmoidea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C20 | -Recto | 3 | 1.2 | 0.7 | 6 | 2.4 | 2.0 |
| C21 | -Año y conducto anal | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C22 | -Hígado y conducto biliar | 13 | 5.3 | 3.7 | 9 | 3.6 | 2.8 |
| C23 | -Vesícula biliar | 3 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C24 | -Otras partes y las no especificadas de las vías biliares | 4 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C25 | -Páncreas | 12 | 4.9 | 3.2 | 13 | 5.1 | 3.9 |
| C26 | -Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C30- C39 | Sistema respiratorio y órganos intratorácicos | 79 | 32.2 | 22.7 | 169 | 66.9 | 48.9 |
| C30 | -Cavidad nasal-oído medio | 1 | 0.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 0.8 |
| C31 | -Senos paranasales | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C32 | -Laringe | 5 | 2.0 | 1.7 | 27 | 10.7 | 7.9 |
| C33 | -Tráquea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C34 | -Bronquios y pulmón | 69 | 28.1 | 19.4 | 135 | 53.4 | 39.0 |
| C37 | -Timo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C38 | -Corazón-mediastino-pleura | 2 | 0.8 | 0.7 | 3 | 1.2 | 1.0 |
| C39 | -Otros sistema respiratorio | 2 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.4 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 10: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Artemisa, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|------------------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C40-C41 | Huesos articulaciones y cartílago articular | 3 | 1.2 | 1.0 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C40 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C41 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados | 3 | 1.2 | 1.0 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| 980-994 | Leucemias | 11 | 4.5 | 4.6 | 11 | 4.4 | 4.3 |
| 9800 | Leucemias sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9801 | Agudas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9800 | Crónicas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9820 | Linfoblásticas sin especificar | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9821 | Linfoblásticas agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9823 | Linfoblásticas crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9860 | Mieloides sin especificar | 2 | 0.8 | 0.7 | 3 | 1.2 | 1.3 |
| 9861 | Mieloides agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1.6 | 1.8 |
| 9863 | Mieloides crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9940-9948 | Otras leucemias | 8 | 3.3 | 3.6 | 4 | 1.6 | 1.3 |
| 9732 | Mielomas | 4 | 1.6 | 1.2 | 4 | 1.6 | 1.4 |
| C44 | Piel | 98 | 39.9 | 27.9 | 143 | 56.6 | 40.3 |
| C47 | Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C48 | Peritoneo-retroperitoneo | 2 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C49 | Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos | 2 | 0.8 | 0.6 | 3 | 1.2 | 0.8 |
| C50 | Mama | 126 | 51.3 | 38.2 | 3 | 1.2 | 0.9 |
| C51-C58 | Órganos genitales femeninos. | 117 | 47.6 | 33.9 | - | - | - |
| C51 | -Vulva | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C52 | -Vagina | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C53 | -Cuello uterino | 58 | 23.6 | 16.7 | - | - | - |
| C54 | -Cuerpo uterino | 21 | 8.5 | 6.5 | - | - | - |
| C55 | -Útero sin especificar | 14 | 5.7 | 4.6 | - | - | - |
| C56 | -Ovario | 24 | 9.8 | 6.3 | - | - | - |
| C57 | -Otros órganos genitales femeninos y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C58 | -Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C60-C63 | Órganos genitales masculinos | - | - | - | 115 | 45.5 | 30.1 |
| C60 | -Pene | - | - | - | 5 | 2.0 | 1.6 |
| C61 | -Glándula prostática | - | - | - | 109 | 43.1 | 28.2 |
| C62 | -Testículo | - | - | - | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C63 | Órganos genitales masculinos y los no especificados | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 10: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Artemisa, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C64- C68 | Tracto urinario | 11 | 4.5 | 2.8 | 38 | 15.0 | 11.2 |
| C64 | -Riñón | 2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.6 | 1.3 |
| C65 | -Pelvis renal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C66 | -Uréter | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C67 | -Vejiga urinaria | 9 | 3.7 | 2.1 | 34 | 13.5 | 9.9 |
| C68 | -Otros órganos urinarios y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C69- C72 | Encéfalo, ojo, otros SNC | 9 | 3.7 | 4.0 | 13 | 5.1 | 3.9 |
| C69 | -Ojo y anexos | 2 | 0.8 | 1.1 | 3 | 1.2 | 0.9 |
| C70 | -Meninges | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C71 | -Encéfalo | 7 | 2.8 | 3.0 | 9 | 3.6 | 2.7 |
| C72 | -Medula espinal-nervios | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C73- C75 | Tiroides, y otras glándulas endocrinas | 19 | 7.7 | 5.0 | 3 | 1.2 | 0.6 |
| C73 | -Glándula tiroides | 19 | 7.7 | 5.0 | 3 | 1.2 | 0.6 |
| C74 | -Glándula suprarrenal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C75 | -Otras glándulas endocrinos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C76 | Sitios mal definidos | 10 | 4.1 | 3.3 | 4 | 1.6 | 1.8 |
| 959-972 | Linfomas total | 19 | 7.7 | 5.9 | 21 | 8.3 | 7.2 |
| 965-966 | - Linfomas Hodgkin | 3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 967-972 | - Linfomas no Hodgkin | 8 | 3.3 | 2.8 | 14 | 5.5 | 4.9 |
| 959 | - Otros sin especificar | 8 | 3.3 | 2.0 | 7 | 2.8 | 2.4 |
| C80 | Sitio primario desconocido | 5 | 2.0 | 1.6 | 5 | 2.0 | 1.9 |
| C00- C80 | Todas las localizaciones | 630 | 256.5 | 182.6 | 686 | 271.5 | 197.3 |

*cifras preliminares

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 11: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Mayabeque, 2008*

| Masculino | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C34 | Bronquios y pulmón | 92 | 47.6 | 31.6 |
| C61 | Glándula prostática | 65 | 33.7 | 17.0 |
| C44 | Piel | 59 | 30.5 | 19.6 |
| C32 | Laringe | 27 | 14.0 | 10.6 |
| C67 | Vejiga urinaria | 24 | 12.4 | 7.0 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 21 | 10.9 | 7.8 |
| 980-994 | Leucemias | 18 | 9.3 | 7.2 |
| C18 | Colon | 17 | 8.8 | 4.2 |
| C25 | Páncreas | 16 | 8.3 | 5.3 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 10 | 5.2 | 3.0 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 429 | 222.1 | 140.7 |

| Femenino | | | | |
|----------|--------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C50 | Mama | 85 | 45.0 | 28.1 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 54 | 28.6 | 18.9 |
| C18 | Colon | 37 | 19.6 | 9.9 |
| C53 | Cuello uterino | 30 | 15.9 | 11.8 |
| C44 | Piel | 25 | 13.2 | 7.1 |
| C54 | Cuerpo uterino | 24 | 12.7 | 9.7 |
| C56 | Ovario | 12 | 6.4 | 4.7 |
| 959-994 | Linfomas | 11 | 5.8 | 3.2 |
| 980-994 | Leucemias | 10 | 5.3 | 5.0 |
| C67 | Vejiga urinaria | 9 | 4.8 | 3.0 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 390 | 206.6 | 131.4 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 12: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Mayabeque, 2008*

| Masculino | | | | | |
|-----------|--------------------------------|------|------|----------|-------|
| CIE-03 | Localización | 1559 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C34 | Bronquios y pulmón | 22 | 17.5 | 70 | 214.9 |
| C61 | Glándula prostática | 2 | 1.6 | 63 | 193.4 |
| C44 | Piel | 17 | 13.5 | 42 | 128.9 |
| C32 | Laringe | 8 | 6.4 | 19 | 58.3 |
| C67 | Vejiga urinaria | 3 | 2.4 | 21 | 64.5 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 11 | 8.7 | 10 | 30.7 |
| C18 | Colon | 3 | 2.4 | 14 | 43.0 |
| C25 | Páncreas | 2 | 1.6 | 14 | 43.0 |
| 980-994 | Leucemias | 7 | 5.6 | 8 | 24.6 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 2 | 1.6 | 8 | 24.6 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 104 | 82.6 | 320 | 982.3 |

| Femenino | | | | | |
|----------|--------------------------|------|-------|----------|-------|
| CIE-03 | Localización | 1559 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C50 | Mama | 34 | 27.9 | 51 | 149.3 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 19 | 15.6 | 35 | 102.4 |
| C18 | Colon | 4 | 3.3 | 33 | 96.6 |
| C53 | Cuello uterino | 19 | 15.6 | 11 | 32.2 |
| C44 | Piel | 6 | 4.9 | 19 | 55.6 |
| C54 | Cuerpo uterino | 11 | 9.0 | 13 | 38.1 |
| C56 | Ovario | 8 | 6.6 | 4 | 11.7 |
| 959-964 | Linfomas | 6 | 4.9 | 5 | 14.6 |
| C25 | Páncreas | 2 | 1.6 | 7 | 20.5 |
| C67 | Vejiga urinaria | 5 | 4.1 | 4 | 11.7 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 146 | 119.8 | 242 | 708.3 |

*cifras preliminares

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 13: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Mayabeque, 2008*

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C00- C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 6 | 3.2 | 2.0 | 21 | 10.9 | 7.8 |
| C00 | -Labio | 1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 |
| C01 | -Base de la lengua | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| C02 | -Otras partes de la lengua | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0.9 |
| C03 | -Encía | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C04 | -Piso de la boca | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1.6 | 1.2 |
| C05 | -Paladar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C06 | -Otras de la boca | 3 | 1.6 | 0.9 | 5 | 2.6 | 1.8 |
| C07 | -Parótida | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0.9 |
| C08 | -Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C09 | -Amígdala | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.4 |
| C10 | -Orofaringe | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.4 |
| C11 | -Nasofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2.6 | 2.0 |
| C12 | -Seno periforme | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C13 | -Hipofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C14 | -Otras cavidad bucal | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C15- C26 | Órganos digestivos | 78 | 41.3 | 23.6 | 69 | 35.7 | 21.2 |
| C15 | -Esófago | 5 | 2.6 | 1.5 | 10 | 5.2 | 3.6 |
| C16 | -Estomago | 3 | 1.6 | 1.2 | 7 | 3.6 | 2.2 |
| C17 | -Intestino delgado | 2 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C18 | -Colon | 37 | 19.6 | 9.9 | 17 | 8.8 | 4.2 |
| C19 | -Unión recto-sigmoidea | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.3 |
| C20 | -Recto | 7 | 3.7 | 2.6 | 1 | 0.5 | 0.3 |
| C21 | -Año y conducto anal | 1 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| C22 | -Hígado y conducto biliar | 8 | 4.2 | 2.5 | 10 | 5.2 | 3.0 |
| C23 | -Vesícula biliar | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.4 |
| C24 | -Otras partes y las no especificadas de las vías biliares | 6 | 3.2 | 1.9 | 5 | 2.6 | 1.8 |
| C25 | -Páncreas | 9 | 4.8 | 3.3 | 16 | 8.3 | 5.3 |
| C26 | -Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C30- C39 | Sistema respiratorio y órganos intratorácicos | 64 | 33.9 | 22.2 | 124 | 64.2 | 43.3 |
| C30 | -Cavidad nasal-oído medio | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0.4 |
| C31 | -Senos paranasales | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.4 |
| C32 | -Laringe | 8 | 4.2 | 2.7 | 27 | 14.0 | 10.6 |
| C33 | -Tráquea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C34 | -Bronquios y pulmón | 54 | 28.6 | 18.9 | 92 | 47.6 | 31.6 |
| C37 | -Timo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C38 | -Corazón-mediastino-pleura | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.3 |
| C39 | -Otros sistema respiratorio | 2 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.3 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 13: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Mayabeque, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|------------------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C40-C41 | Huesos articulaciones y cartílago articular | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 2.6 | 1.4 |
| C40 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0.9 |
| C41 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1.6 | 0.6 |
| 980-994 | Leucemias | 10 | 5.3 | 5.0 | 18 | 9.3 | 7.2 |
| 9800 | Leucemias sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.4 |
| 9801 | Agudas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 9800 | Crónicas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9820 | Linfoblásticas sin especificar | 2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.4 |
| 9821 | Linfoblásticas agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9823 | Linfoblásticas crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9860 | Mieloides sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.2 |
| 9861 | Mieloides agudas | 1 | 0.5 | 0.7 | 2 | 1.0 | 1.7 |
| 9863 | Mieloides crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9940-9948 | Otras leucemias | 7 | 3.7 | 3.3 | 12 | 6.2 | 4.2 |
| 9732 | Mielomas | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.4 |
| C44 | Piel | 25 | 13.2 | 7.1 | 59 | 30.5 | 19.6 |
| C47 | Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.4 |
| C48 | Peritoneo-retroperitoneo | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0.6 |
| C49 | Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C50 | Mama | 85 | 45.0 | 28.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C51-C58 | Órganos genitales femeninos. | 74 | 39.2 | 27.6 | - | - | - |
| C51 | -Vulva | 1 | 0.5 | 0.4 | - | - | - |
| C52 | -Vagina | 1 | 0.5 | 0.4 | - | - | - |
| C53 | -Cuello uterino | 30 | 15.9 | 11.8 | - | - | - |
| C54 | -Cuerpo uterino | 24 | 12.7 | 9.7 | - | - | - |
| C55 | -Útero sin especificar | 6 | 3.2 | 0.9 | - | - | - |
| C56 | -Ovario | 12 | 6.4 | 4.7 | - | - | - |
| C57 | -Otros órganos genitales femeninos y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C58 | -Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C60-C63 | Órganos genitales masculinos | - | - | - | 67 | 34.7 | 18.1 |
| C60 | -Pene | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C61 | -Glándula prostática | - | - | - | 65 | 33.7 | 17.0 |
| C62 | -Testículo | - | - | - | 2 | 1.0 | 1.2 |
| C63 | Órganos genitales masculinos y los no especificados | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 13 Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Mayabeque, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C64- C68 | Tracto urinario | 10 | 5.3 | 3.3 | 29 | 15.0 | 8.6 |
| C64 | -Riñón | 1 | 0.5 | 0.3 | 5 | 2.6 | 1.7 |
| C65 | -Pelvis renal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C66 | -Uréter | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C67 | -Vejiga urinaria | 9 | 4.8 | 3.0 | 24 | 12.4 | 7.0 |
| C68 | -Otros órganos urinarios y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C69- C72 | Encéfalo, ojo, otros SNC | 8 | 4.2 | 3.5 | 11 | 5.7 | 4.1 |
| C69 | -Ojo y anexos | 2 | 1.1 | 1.1 | 4 | 2.1 | 1.2 |
| C70 | -Meninges | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C71 | -Encéfalo | 5 | 2.6 | 2.0 | 7 | 3.6 | 3.0 |
| C72 | -Medula espinal-nervios | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C73- C75 | Tiroides, y otras glándulas endocrinas | 7 | 3.7 | 2.7 | 2 | 1.0 | 0.9 |
| C73 | -Glándula tiroides | 7 | 3.7 | 2.7 | 2 | 1.0 | 0.9 |
| C74 | -Glándula suprarrenal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C75 | -Otras glándulas endocrinos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C76 | Sitios mal definidos | 5 | 2.6 | 1.3 | 3 | 1.6 | 0.7 |
| 959-972 | Linfomas total | 11 | 5.8 | 3.2 | 9 | 4.7 | 3.1 |
| 965-966 | - Linfomas Hodgkin | 1 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.1 |
| 967-972 | - Linfomas no Hodgkin | 5 | 2.6 | 1.3 | 5 | 2.6 | 2.1 |
| 959 | - Otros sin especificar | 5 | 2.6 | 1.6 | 3 | 1.6 | 1.0 |
| C80 | Sitio primario desconocido | 5 | 2.6 | 2.0 | 8 | 4.1 | 4.1 |
| C00- C80 | Todas las localizaciones | 390 | 206.6 | 131.4 | 429 | 222.1 | 140.7 |

*cifras preliminares

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 14: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. La Habana, 2008*

| Masculino | | | | |
|-----------|--------------------------------|------|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C34 | Bronquios y pulmón | 634 | 61.2 | 40.4 |
| C61 | Glándula prostática | 522 | 50.4 | 28.7 |
| C44 | Piel | 385 | 37.2 | 24.1 |
| C18 | Colon | 204 | 19.7 | 12.6 |
| C32 | Laringe | 192 | 18.5 | 13.1 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 166 | 16.0 | 11.2 |
| C67 | Vejiga urinaria | 122 | 11.8 | 7.4 |
| 959-964 | Linfomas | 114 | 11.0 | 7.8 |
| C16 | Estomago | 88 | 8.5 | 5.6 |
| C25 | Páncreas | 87 | 8.4 | 5.6 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 3093 | 298.6 | 194.9 |

| Femenino | | | | |
|----------|--------------------------|------|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C50 | Mama | 890 | 80.1 | 46.4 |
| C44 | Piel | 372 | 33.5 | 18.0 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 367 | 33.0 | 18.3 |
| C18 | Colon | 290 | 26.1 | 12.0 |
| C53 | Cuello uterino | 261 | 23.5 | 15.6 |
| C54 | Cuerpo uterino | 117 | 10.5 | 6.0 |
| C56 | Ovario | 112 | 10.1 | 7.1 |
| 959*964 | Linfomas | 82 | 7.4 | 4.4 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 76 | 6.8 | 3.2 |
| 980-994 | Leucemias | 72 | 6.5 | 3.6 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 3450 | 310.3 | 175.5 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 15: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. La Habana, 2008*

| Masculino | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------|-------|----------|--------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C34 | Bronquios y pulmón | 148 | 21.6 | 485 | 285.9 |
| C61 | Glándula prostática | 33 | 4.8 | 489 | 288.2 |
| C44 | Piel | 105 | 15.3 | 279 | 164.4 |
| C18 | Colon | 32 | 4.7 | 172 | 101.4 |
| C32 | Laringe | 73 | 10.6 | 119 | 70.1 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 77 | 11.2 | 89 | 52.5 |
| C67 | Vejiga urinaria | 25 | 3.6 | 97 | 57.2 |
| 959-964 | Linfomas | 56 | 8.2 | 55 | 32.4 |
| C16 | Estomago | 22 | 3.2 | 66 | 38.9 |
| C25 | Páncreas | 20 | 2.9 | 67 | 39.5 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 773 | 112.8 | 2299 | 1355.0 |

| Femenino | | | | | |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------|-------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C50 | Mama | 387 | 54.9 | 503 | 213.2 |
| C44 | Piel | 119 | 16.9 | 252 | 106.8 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 99 | 14.0 | 268 | 113.6 |
| C18 | Colon | 45 | 6.4 | 245 | 103.8 |
| C53 | Cuello uterino | 181 | 25.7 | 80 | 33.9 |
| C54 | Cuerpo uterino | 32 | 4.5 | 85 | 36.0 |
| C56 | Ovario | 62 | 8.8 | 49 | 20.8 |
| 959-964 | Linfomas | 36 | 5.1 | 45 | 19.1 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 19 | 2.7 | 57 | 24.2 |
| 980-994 | Leucemias | 19 | 2.7 | 52 | 22.0 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 1244 | 176.4 | 2190 | 928.2 |

*cifras preliminares

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 16: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. La Habana, 2008*

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C00- C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 49 | 4.4 | 2.7 | 166 | 16.0 | 11.2 |
| C00 | -Labio | 4 | 0.4 | 0.4 | 7 | 0.7 | 0.5 |
| C01 | -Base de la lengua | 1 | 0.1 | 0.1 | 17 | 1.6 | 1.2 |
| C02 | -Otras partes de la lengua | 7 | 0.6 | 0.5 | 23 | 2.2 | 1.6 |
| C03 | -Encía | 4 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0.4 | 0.3 |
| C04 | -Piso de la boca | 1 | 0.1 | 0.1 | 9 | 0.9 | 0.7 |
| C05 | -Paladar | 5 | 0.4 | 0.3 | 6 | 0.6 | 0.4 |
| C06 | -Otras de la boca | 14 | 1.3 | 0.7 | 27 | 2.6 | 1.7 |
| C07 | -Parótida | 2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 0.3 |
| C08 | -Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas | 3 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| C09 | -Amígdala | 5 | 0.4 | 0.4 | 23 | 2.2 | 1.7 |
| C10 | -Orofaringe | 1 | 0.1 | 0.1 | 16 | 1.5 | 1.2 |
| C11 | -Nasofaringe | 1 | 0.1 | 0.1 | 17 | 1.6 | 1.2 |
| C12 | -Seno periforme | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C13 | -Hipofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0.9 | 0.7 |
| C14 | -Otras cavidad bucal | 1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0.4 | 0.3 |
| C15- C26 | Órganos digestivos | 678 | 61.0 | 29.3 | 620 | 59.9 | 38.8 |
| C15 | -Esófago | 32 | 2.9 | 1.6 | 80 | 7.7 | 5.0 |
| C16 | -Estomago | 65 | 5.8 | 2.5 | 88 | 8.5 | 5.6 |
| C17 | -Intestino delgado | 8 | 0.7 | 0.4 | 8 | 0.8 | 0.6 |
| C18 | -Colon | 290 | 26.1 | 12.0 | 204 | 19.7 | 12.6 |
| C19 | -Unión recto-sigmoidea | 8 | 0.7 | 0.4 | 5 | 0.5 | 0.3 |
| C20 | -Recto | 49 | 4.4 | 2.4 | 31 | 3.0 | 2.0 |
| C21 | -Año y conducto anal | 32 | 2.9 | 1.8 | 7 | 0.7 | 0.5 |
| C22 | -Hígado y conducto biliar | 76 | 6.8 | 3.2 | 70 | 6.8 | 4.6 |
| C23 | -Vesícula biliar | 10 | 0.9 | 0.5 | 7 | 0.7 | 0.5 |
| C24 | -Otras partes y las no especificadas de las vías biliares | 38 | 3.4 | 1.9 | 29 | 2.8 | 1.8 |
| C25 | -Páncreas | 70 | 6.3 | 3.1 | 87 | 8.4 | 5.6 |
| C26 | -Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0.4 | 0.2 |
| C30- C39 | Sistema respiratorio y órganos intratorácicos | 429 | 38.6 | 21.6 | 851 | 82.2 | 55.2 |
| C30 | -Cavidad nasal-oído medio | 7 | 0.6 | 0.6 | 7 | 0.7 | 0.5 |
| C31 | -Senos paranasales | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.3 |
| C32 | -Laringe | 39 | 3.5 | 2.1 | 192 | 18.5 | 13.1 |
| C33 | -Tráquea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C34 | -Bronquios y pulmón | 367 | 33.0 | 18.3 | 634 | 61.2 | 40.4 |
| C37 | -Timo | 1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| C38 | -Corazón-mediastino-pleura | 5 | 0.4 | 0.3 | 9 | 0.9 | 0.7 |
| C39 | -Otros sistema respiratorio | 9 | 0.8 | 0.4 | 6 | 0.6 | 0.5 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 16: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. La Habana, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|------------------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C40-C41 | Huesos articulaciones y cartílago articular | 20 | 1.8 | 1.0 | 10 | 1.0 | 0.9 |
| C40 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros | 6 | 0.5 | 0.4 | 5 | 0.5 | 0.6 |
| C41 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados | 14 | 1.3 | 0.7 | 5 | 0.5 | 0.4 |
| 980-994 | Leucemias | 72 | 6.5 | 3.6 | 57 | 5.5 | 4.2 |
| 9800 | Leucemias sin especificar | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 |
| 9801 | Agudas sin especificar | 3 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0.4 | 0.3 |
| 9800 | Crónicas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9820 | Linfoblásticas sin especificar | 2 | 0.2 | 0.1 | 4 | 0.4 | 0.5 |
| 9821 | Linfoblásticas agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9823 | Linfoblásticas crónicas | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9860 | Mieloides sin especificar | 2 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 9861 | Mieloides agudas | 2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.2 |
| 9863 | Mieloides crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9940-9948 | Otras leucemias | 61 | 5.5 | 2.9 | 46 | 4.4 | 3.2 |
| 9732 | Mielomas | 11 | 1.0 | 0.6 | 7 | 0.7 | 0.6 |
| C44 | Piel | 372 | 33.5 | 18.0 | 385 | 37.2 | 24.1 |
| C47 | Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo | 2 | 0.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0.2 |
| C48 | Peritoneo-retroperitoneo | 8 | 0.7 | 0.3 | 4 | 0.4 | 0.3 |
| C49 | Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos | 2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.5 | 0.4 |
| C50 | Mama | 890 | 80.1 | 46.4 | 18 | 1.7 | 1.2 |
| C51-C58 | Órganos genitales femeninos. | 572 | 51.5 | 32.5 | - | - | - |
| C51 | -Vulva | 14 | 1.3 | 0.6 | - | - | - |
| C52 | -Vagina | 12 | 1.1 | 0.9 | - | - | - |
| C53 | -Cuello uterino | 261 | 23.5 | 15.6 | - | - | - |
| C54 | -Cuerpo uterino | 117 | 10.5 | 6.0 | - | - | - |
| C55 | -Útero sin especificar | 52 | 4.7 | 2.4 | - | - | - |
| C56 | -Ovario | 112 | 10.1 | 7.1 | - | - | - |
| C57 | -Otros órganos genitales femeninos y los no especificados | 4 | 0.4 | 0.2 | - | - | - |
| C58 | -Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C60-C63 | Órganos genitales masculinos | - | - | - | 540 | 52.1 | 30.1 |
| C60 | -Pene | - | - | - | 9 | 0.9 | 0.6 |
| C61 | -Glándula prostática | - | - | - | 522 | 50.4 | 28.7 |
| C62 | -Testículo | - | - | - | 8 | 0.8 | 0.8 |
| C63 | Órganos genitales masculinos y los no especificados | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 16: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. La Habana, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C64- C68 | Tracto urinario | 100 | 9.0 | 5.2 | 181 | 17.5 | 11.6 |
| C64 | -Riñón | 38 | 3.4 | 2.2 | 56 | 5.4 | 4.0 |
| C65 | -Pelvis renal | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| C66 | -Uréter | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 |
| C67 | -Vejiga urinaria | 60 | 5.4 | 2.9 | 122 | 11.8 | 7.4 |
| C68 | -Otros órganos urinarios y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C69- C72 | Encéfalo, ojo, otros SNC | 44 | 4.0 | 2.6 | 57 | 5.5 | 4.0 |
| C69 | -Ojo y anexos | 8 | 0.7 | 0.5 | 18 | 1.7 | 1.4 |
| C70 | -Meninges | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0.2 |
| C71 | -Encéfalo | 34 | 3.1 | 2.0 | 38 | 3.7 | 2.6 |
| C72 | -Medula espinal-nervios | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C73- C75 | Tiroides, y otras glándulas endocrinas | 73 | 6.6 | 4.6 | 20 | 1.9 | 1.5 |
| C73 | -Glándula tiroides | 71 | 6.4 | 4.6 | 15 | 1.4 | 1.1 |
| C74 | -Glándula suprarrenal | 2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 0.4 |
| C75 | -Otras glándulas endocrinos | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0.2 |
| C76 | Sitios mal definidos | 23 | 2.1 | 1.5 | 33 | 3.2 | 2.3 |
| 959-972 | Linfomas total | 82 | 7.4 | 4.4 | 114 | 11.0 | 7.8 |
| 965-966 | - Linfomas Hodgkin | 7 | 0.6 | 0.5 | 11 | 1.1 | 0.9 |
| 967-972 | - Linfomas no Hodgkin | 38 | 3.4 | 2.0 | 61 | 5.9 | 4.4 |
| 959 | - Otros sin especificar | 37 | 3.3 | 1.9 | 42 | 4.1 | 2.7 |
| C80 | Sitio primario desconocido | 23 | 2.1 | 1.8 | 22 | 2.1 | 1.5 |
| C00- C80 | Todas las localizaciones | 3450 | 310.3 | 175.5 | 3093 | 298.6 | 194.9 |

*cifras preliminares

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 17: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Matanzas, 2008*

| Masculino | | | | |
|-----------|--------------------------------|------|-------|--------|
| CIE-O3 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C44 | Piel | 339 | 98.5 | 65.5 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 190 | 55.2 | 36.8 |
| C61 | Glándula prostática | 150 | 43.6 | 23.8 |
| C18 | Colon | 67 | 19.5 | 12.9 |
| C32 | Laringe | 53 | 15.4 | 11.1 |
| C67 | Vejiga urinaria | 51 | 14.8 | 9.5 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 46 | 13.4 | 9.6 |
| C16 | Estomago | 31 | 9.0 | 6.3 |
| 959-964 | Linfomas | 26 | 7.6 | 5.3 |
| 980-994 | Leucemias | 25 | 7.3 | 5.5 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 1155 | 335.5 | 221.3 |

| Femenino | | | | |
|----------|--------------------------|------|-------|--------|
| CIE-O3 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C44 | Piel | 294 | 86.0 | 52.8 |
| C50 | Mama | 221 | 64.6 | 40.7 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 99 | 29.0 | 18.6 |
| C53 | Cuello uterino | 72 | 21.1 | 14.2 |
| C18 | Colon | 66 | 19.3 | 10.7 |
| C54 | Cuerpo uterino | 47 | 13.7 | 9.4 |
| 959-964 | Linfomas | 32 | 9.4 | 8.7 |
| C73 | Glándula tiroides | 26 | 7.6 | 5.6 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 22 | 6.4 | 4.2 |
| C67 | Vejiga urinaria | 19 | 5.6 | 3.3 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 1096 | 320.5 | 208.1 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000.

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000

Tabla 18: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Matanzas, 2008*

| Masculino | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------|-------|----------|--------|
| CIE-O3 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C44 | Piel | 122 | 53.7 | 217 | 385.7 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 51 | 22.5 | 138 | 245.3 |
| C61 | Glándula prostática | 9 | 4.0 | 138 | 245.3 |
| C18 | Colon | 18 | 7.9 | 49 | 87.1 |
| C32 | Laringe | 22 | 9.7 | 31 | 55.1 |
| C67 | Vejiga urinaria | 10 | 4.4 | 41 | 72.9 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 23 | 10.1 | 23 | 40.9 |
| C16 | Estomago | 8 | 3.5 | 22 | 39.1 |
| 959-964 | Linfomas | 15 | 6.6 | 10 | 17.8 |
| 980-994 | Leucemias | 10 | 4.4 | 13 | 23.1 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 357 | 157.2 | 786 | 1397.0 |

| Femenino | | | | | |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------|--------|
| CIE-O3 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C44 | Piel | 101 | 45.3 | 193 | 318.4 |
| C50 | Mama | 106 | 47.5 | 115 | 189.7 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 25 | 11.2 | 74 | 122.1 |
| C53 | Cuello uterino | 54 | 24.2 | 17 | 28.0 |
| C18 | Colon | 12 | 5.4 | 54 | 89.1 |
| C54 | Cuerpo uterino | 15 | 6.7 | 32 | 52.8 |
| 959-964 | Linfomas | 13 | 5.8 | 14 | 23.1 |
| C73 | Glándula tiroides | 25 | 11.2 | 1 | 1.6 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 2 | 0.9 | 20 | 33.0 |
| C56 | Ovario | 14 | 6.3 | 5 | 8.2 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 449 | 201.3 | 637 | 1050.8 |

*cifras preliminares

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 19: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Matanzas, 2008*

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C00- C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 17 | 5.0 | 3.0 | 46 | 13.4 | 9.6 |
| C00 | -Labio | 4 | 1.2 | 0.8 | 8 | 2.3 | 1.8 |
| C01 | -Base de la lengua | 0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 2.3 | 2.0 |
| C02 | -Otras partes de la lengua | 3 | 0.9 | 0.6 | 5 | 1.5 | 0.9 |
| C03 | -Encía | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C04 | -Piso de la boca | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 2.0 | 1.6 |
| C05 | -Paladar | 3 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.2 |
| C06 | -Otras de la boca | 3 | 0.9 | 0.5 | 3 | 0.9 | 0.6 |
| C07 | -Parótida | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C08 | -Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C09 | -Amígdala | 1 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.5 |
| C10 | -Orofaringe | 2 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C11 | -Nasofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1.2 | 0.7 |
| C12 | -Seno periforme | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C13 | -Hipofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C14 | -Otras cavidad bucal | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1.7 | 1.4 |
| C15- C26 | Órganos digestivos | 153 | 44.7 | 27.8 | 168 | 48.8 | 32.3 |
| C15 | -Esófago | 3 | 0.9 | 0.6 | 17 | 4.9 | 3.4 |
| C16 | -Estomago | 15 | 4.4 | 3.3 | 31 | 9.0 | 6.3 |
| C17 | -Intestino delgado | 3 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C18 | -Colon | 66 | 19.3 | 10.7 | 67 | 19.5 | 12.9 |
| C19 | -Unión recto-sigmoidea | 1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C20 | -Recto | 18 | 5.3 | 4.3 | 18 | 5.2 | 3.2 |
| C21 | -Año y conducto anal | 9 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C22 | -Hígado y conducto biliar | 22 | 6.4 | 4.2 | 11 | 3.2 | 2.0 |
| C23 | -Vesícula biliar | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C24 | -Otras partes y las no especificadas de las vías biliares | 5 | 1.5 | 1.1 | 2 | 0.6 | 0.5 |
| C25 | -Páncreas | 10 | 2.9 | 1.8 | 20 | 5.8 | 3.9 |
| C26 | -Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C30- C39 | Sistema respiratorio y órganos intratorácicos | 114 | 33.3 | 21.1 | 255 | 74.1 | 50.3 |
| C30 | -Cavidad nasal-oído medio | 1 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.9 | 0.8 |
| C31 | -Senos paranasales | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C32 | -Laringe | 7 | 2.0 | 1.2 | 53 | 15.4 | 11.1 |
| C33 | -Tráquea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C34 | -Bronquios y pulmón | 99 | 29.0 | 18.6 | 190 | 55.2 | 36.8 |
| C37 | -Timo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C38 | -Corazón-mediastino-pleura | 3 | 0.9 | 0.6 | 8 | 2.3 | 1.5 |
| C39 | -Otros sistema respiratorio | 4 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.0 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 19: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Matanzas, 2008* (continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|------------------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C40-C41 | Huesos articulaciones y cartílago articular | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1.2 | 1.3 |
| C40 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.4 |
| C41 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.9 | 1.0 |
| 980-994 | Leucemias | 15 | 4.4 | 3.0 | 25 | 7.3 | 5.5 |
| 9800 | Leucemias sin especificar | 2 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 9801 | Agudas sin especificar | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 |
| 9800 | Crónicas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9820 | Linfoblásticas sin especificar | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 |
| 9821 | Linfoblásticas agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9823 | Linfoblásticas crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9860 | Mieloides sin especificar | 1 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.9 | 0.7 |
| 9861 | Mieloides agudas | 1 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.7 |
| 9863 | Mieloides crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9940-9948 | Otras leucemias | 9 | 2.6 | 1.8 | 17 | 4.9 | 3.9 |
| 9732 | Mielomas | 3 | 0.9 | 0.6 | 3 | 0.9 | 0.7 |
| C44 | Piel | 294 | 86.0 | 52.8 | 339 | 98.5 | 65.5 |
| C47 | Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C48 | Peritoneo-retroperitoneo | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1.7 | 1.4 |
| C49 | Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C50 | Mama | 221 | 64.6 | 40.7 | 4 | 1.2 | 1.0 |
| C51-C58 | Órganos genitales femeninos. | 157 | 45.9 | 31.5 | - | - | - |
| C51 | -Vulva | 5 | 1.5 | 1.0 | - | - | - |
| C52 | -Vagina | 1 | 0.3 | 0.1 | - | - | - |
| C53 | -Cuello uterino | 72 | 21.1 | 14.2 | - | - | - |
| C54 | -Cuerpo uterino | 47 | 13.7 | 9.4 | - | - | - |
| C55 | -Útero sin especificar | 11 | 3.2 | 2.3 | - | - | - |
| C56 | -Ovario | 19 | 5.6 | 4.4 | - | - | - |
| C57 | -Otros órganos genitales femeninos y los no especificados | 2 | 0.6 | 0.5 | - | - | - |
| C58 | -Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C60-C63 | Órganos genitales masculinos | - | - | - | 160 | 46.5 | 25.8 |
| C60 | -Pene | - | - | - | 9 | 2.6 | 1.9 |
| C61 | -Glándula prostática | - | - | - | 150 | 43.6 | 23.8 |
| C62 | -Testículo | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C63 | Órganos genitales masculinos y los no especificados | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 19: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Matanzas, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|----------------|---|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|------------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C64-C68 | Tracto urinario | 28 | 8.2 | 5.3 | 64 | 18.6 | 11.9 |
| C64 | -Riñón | 8 | 2.3 | 1.8 | 12 | 3.5 | 2.4 |
| C65 | -Pelvis renal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C66 | -Uréter | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C67 | -Vejiga urinaria | 19 | 5.6 | 3.3 | 51 | 14.8 | 9.5 |
| C68 | -Otros órganos urinarios y los no especificados | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 |
| C69-C72 | Encéfalo, ojo, otros SNC | 23 | 6.7 | 6.3 | 25 | 7.3 | 5.4 |
| C69 | -Ojo y anexos | 7 | 2.0 | 1.5 | 5 | 1.5 | 1.0 |
| C70 | -Meninges | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C71 | -Encéfalo | 15 | 4.4 | 4.6 | 19 | 5.5 | 4.3 |
| C72 | -Medula espinal-nervios | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.2 |
| C73-C75 | Tiroides, y otras glándulas endocrinas | 27 | 7.9 | 5.8 | 8 | 2.3 | 1.9 |
| C73 | -Glándula tiroides | 26 | 7.6 | 5.6 | 7 | 2.0 | 1.7 |
| C74 | -Glándula suprarrenal | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.2 |
| C75 | -Otras glándulas endocrinas | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C76 | Sitios mal definidos | 7 | 2.0 | 1.2 | 13 | 3.8 | 2.4 |
| 959-972 | Linfomas total | 32 | 9.4 | 8.7 | 26 | 7.6 | 5.3 |
| 965-966 | - Linfomas Hodgkin | 3 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.4 |
| 967-972 | - Linfomas no Hodgkin | 22 | 6.4 | 6.7 | 18 | 5.2 | 3.8 |
| 959 | - Otros sin especificar | 7 | 2.0 | 1.3 | 7 | 2.0 | 1.3 |
| C80 | Sitio primario desconocido | 5 | 1.5 | 1.0 | 9 | 2.6 | 1.9 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 1096 | 320.5 | 208.1 | 1155 | 335.5 | 221.3 |

*cifras preliminares

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 20: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Villa Clara, 2008*

| Masculino | | | | |
|-----------|--------------------------------|------|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C44 | Piel | 641 | 158.4 | 93.3 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 212 | 52.4 | 29.8 |
| C61 | Glándula prostática | 161 | 39.8 | 17.8 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 94 | 23.2 | 15.4 |
| C32 | Laringe | 86 | 21.3 | 13.3 |
| C67 | Vejiga urinaria | 63 | 15.6 | 8.8 |
| 959-964 | Linfomas | 52 | 12.8 | 9.4 |
| C18 | Colon | 52 | 12.8 | 7.1 |
| 980-994 | Leucemias | 37 | 9.1 | 6.7 |
| C16 | Estomago | 28 | 6.9 | 3.8 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 1664 | 411.2 | 244.0 |

| Femenino | | | | |
|----------|--------------------------------|------|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C44 | Piel | 614 | 153.4 | 89.0 |
| C50 | Mama | 201 | 50.2 | 31.3 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 110 | 27.5 | 15.6 |
| C18 | Colon | 79 | 19.7 | 10.3 |
| C53 | Cuello uterino | 64 | 16.0 | 9.9 |
| 959-964 | Linfomas | 45 | 11.2 | 8.1 |
| C54 | Cuerpo uterino | 35 | 8.7 | 5.9 |
| C56 | Ovario | 34 | 8.5 | 6.1 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 29 | 7.2 | 4.4 |
| C16 | Estomago | 25 | 6.2 | 2.9 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 1503 | 375.6 | 219.8 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 21: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Villa Clara, 2008*

| Masculino | | | | | |
|-----------|--------------------------------|------|-------|----------|--------|
| CIE-03 | Localización | 1559 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C44 | Piel | 219 | 85.2 | 422 | 540.1 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 38 | 14.8 | 174 | 222.7 |
| C61 | Glándula prostática | 7 | 2.7 | 154 | 197.1 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 36 | 14.0 | 58 | 74.2 |
| C32 | Laringe | 25 | 9.7 | 61 | 78.1 |
| C67 | Vejiga urinaria | 11 | 4.3 | 52 | 66.6 |
| C18 | Colon | 9 | 3.5 | 43 | 55.0 |
| 959-964 | Linfomas | 24 | 9.3 | 27 | 34.6 |
| 980-994 | Leucemias | 13 | 5.1 | 20 | 25.6 |
| C16 | Estomago | 7 | 2.7 | 21 | 26.9 |
| C00C80 | Todas las localizaciones | 476 | 185.3 | 1176 | 1505.1 |

| Femenino | | | | | |
|----------|--------------------------------|------|-------|----------|--------|
| CIE-03 | Localización | 1559 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C44 | Piel | 236 | 93.9 | 378 | 457.4 |
| C50 | Mama | 104 | 41.4 | 97 | 117.4 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 38 | 15.1 | 72 | 87.1 |
| C18 | Colon | 15 | 6.0 | 63 | 76.2 |
| C53 | Cuello uterino | 48 | 19.1 | 16 | 19.4 |
| 959-964 | Linfomas | 20 | 8.0 | 22 | 26.6 |
| C54 | Cuerpo uterino | 14 | 5.6 | 21 | 25.4 |
| C56 | Ovario | 19 | 7.6 | 14 | 16.9 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 8 | 3.2 | 21 | 25.4 |
| C16 | Estomago | 7 | 2.8 | 18 | 21.8 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 599 | 238.3 | 899 | 1087.8 |

*cifras preliminares

tasa: tasa especifica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 22: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Villa Clara, 2008*

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C00- C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 29 | 7.2 | 4.4 | 94 | 23.2 | 15.4 |
| C00 | -Labio | 5 | 1.2 | 0.8 | 12 | 3.0 | 1.9 |
| C01 | -Base de la lengua | 1 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.7 | 0.3 |
| C02 | -Otras partes de la lengua | 7 | 1.7 | 1.2 | 11 | 2.7 | 2.1 |
| C03 | -Encía | 2 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| C04 | -Piso de la boca | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1.2 | 0.8 |
| C05 | -Paladar | 2 | 0.5 | 0.2 | 7 | 1.7 | 1.4 |
| C06 | -Otras de la boca | 4 | 1.0 | 0.5 | 10 | 2.5 | 2.0 |
| C07 | -Parótida | 2 | 0.5 | 0.4 | 5 | 1.2 | 1.2 |
| C08 | -Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.4 |
| C09 | -Amígdala | 1 | 0.2 | 0.2 | 9 | 2.2 | 1.4 |
| C10 | -Orofaringe | 1 | 0.2 | 0.3 | 10 | 2.5 | 1.6 |
| C11 | -Nasofaringe | 2 | 0.5 | 0.4 | 5 | 1.2 | 0.7 |
| C12 | -Seno periforme | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C13 | -Hipofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 2.0 | 1.4 |
| C14 | -Otras cavidad bucal | 1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1.2 | 0.6 |
| C15- C26 | Órganos digestivos | 181 | 45.2 | 22.8 | 173 | 42.7 | 23.7 |
| C15 | -Esófago | 3 | 0.7 | 0.6 | 26 | 6.4 | 3.8 |
| C16 | -Estomago | 25 | 6.2 | 2.9 | 28 | 6.9 | 3.8 |
| C17 | -Intestino delgado | 3 | 0.7 | 0.4 | 4 | 1.0 | 0.8 |
| C18 | -Colon | 79 | 19.7 | 10.3 | 52 | 12.8 | 7.1 |
| C19 | -Unión recto-sigmoidea | 4 | 1.0 | 0.7 | 5 | 1.2 | 0.7 |
| C20 | -Recto | 22 | 5.5 | 2.4 | 22 | 5.4 | 3.0 |
| C21 | -Año y conducto anal | 5 | 1.2 | 0.9 | 2 | 0.5 | 0.3 |
| C22 | -Hígado y conducto biliar | 13 | 3.2 | 1.9 | 19 | 4.7 | 3.1 |
| C23 | -Vesícula biliar | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C24 | -Otras partes y las no especificadas de las vías biliares | 3 | 0.7 | 0.6 | 2 | 0.5 | 0.4 |
| C25 | -Páncreas | 22 | 5.5 | 2.5 | 13 | 3.2 | 1.2 |
| C26 | -Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C30- C39 | Sistema respiratorio y órganos intratorácicos | 136 | 34.0 | 19.1 | 310 | 76.6 | 44.8 |
| C30 | -Cavidad nasal-oído medio | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.4 |
| C31 | -Senos paranasales | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.4 |
| C32 | -Laringe | 13 | 3.2 | 2.0 | 86 | 21.3 | 13.3 |
| C33 | -Tráquea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C34 | -Bronquios y pulmón | 110 | 27.5 | 15.6 | 212 | 52.4 | 29.8 |
| C37 | -Timo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C38 | -Corazón-mediastino-pleura | 7 | 1.7 | 1.0 | 5 | 1.2 | 1.0 |
| C39 | -Otros sistema respiratorio | 6 | 1.5 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0.3 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 22: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Villa Clara, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|------------------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C40-C41 | Huesos articulaciones y cartílago articular | 4 | 1.0 | 0.8 | 4 | 1.0 | 0.8 |
| C40 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros | 3 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| C41 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados | 1 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.7 | 0.6 |
| 980-994 | Leucemias | 22 | 5.5 | 2.4 | 37 | 9.1 | 6.7 |
| 9800 | Leucemias sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 9801 | Agudas sin especificar | 2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9800 | Crónicas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9820 | Linfoblásticas sin especificar | 1 | 0.2 | 0.1 | 6 | 1.5 | 2.8 |
| 9821 | Linfoblásticas agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9823 | Linfoblásticas crónicas | 3 | 0.7 | 0.3 | 3 | 0.7 | 0.4 |
| 9860 | Mieloides sin especificar | 5 | 1.2 | 0.4 | 4 | 1.0 | 0.6 |
| 9861 | Mieloides agudas | 1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 9863 | Mieloides crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9940-9948 | Otras leucemias | 10 | 2.5 | 1.2 | 22 | 5.4 | 2.7 |
| 9732 | Mielomas | 3 | 0.7 | 0.6 | 5 | 1.2 | 0.9 |
| C44 | Piel | 614 | 153.4 | 89.0 | 641 | 158.4 | 93.3 |
| C47 | Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.4 |
| C48 | Peritoneo-retroperitoneo | 4 | 1.0 | 0.7 | 6 | 1.5 | 1.1 |
| C49 | Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos | 2 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.5 | 0.4 |
| C50 | Mama | 201 | 50.2 | 31.3 | 5 | 1.2 | 0.9 |
| C51-C58 | Órganos genitales femeninos. | 149 | 37.2 | 23.7 | - | - | - |
| C51 | -Vulva | 5 | 1.2 | 0.8 | - | - | - |
| C52 | -Vagina | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
| C53 | -Cuello uterino | 64 | 16.0 | 9.9 | - | - | - |
| C54 | -Cuerpo uterino | 35 | 8.7 | 5.9 | - | - | - |
| C55 | -Útero sin especificar | 10 | 2.5 | 1.1 | - | - | - |
| C56 | -Ovario | 34 | 8.5 | 6.1 | - | - | - |
| C57 | -Otros órganos genitales femeninos y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C58 | -Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C60-C63 | Órganos genitales masculinos | - | - | - | 172 | 42.5 | 19.9 |
| C60 | -Pene | - | - | - | 7 | 1.7 | 1.0 |
| C61 | -Glándula prostática | - | - | - | 161 | 39.8 | 17.8 |
| C62 | -Testículo | - | - | - | 4 | 1.0 | 1.2 |
| C63 | Órganos genitales masculinos y los no especificados | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 22: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Villa Clara, 2008* (continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C64- C68 | Tracto urinario | 43 | 10.7 | 6.4 | 77 | 19.0 | 11.0 |
| C64 | -Riñón | 19 | 4.7 | 3.1 | 11 | 2.7 | 1.7 |
| C65 | -Pelvis renal | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.4 |
| C66 | -Uréter | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0.4 |
| C67 | -Vejiga urinaria | 23 | 5.7 | 3.3 | 63 | 15.6 | 8.8 |
| C68 | -Otros órganos urinarios y los no especificados | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C69- C72 | Encéfalo, ojo, otros SNC | 20 | 5.0 | 2.8 | 32 | 7.9 | 7.7 |
| C69 | -Ojo y anexos | 6 | 1.5 | 0.5 | 9 | 2.2 | 2.2 |
| C70 | -Meninges | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C71 | -Encéfalo | 13 | 3.2 | 2.3 | 22 | 5.4 | 5.3 |
| C72 | -Médula espinal-nervios | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| C73- C75 | Tiroides, y otras glándulas endocrinas | 26 | 6.5 | 4.7 | 11 | 2.7 | 2.1 |
| C73 | -Glándula tiroides | 25 | 6.2 | 4.6 | 11 | 2.7 | 2.1 |
| C74 | -Glándula suprarrenal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C75 | -Otras glándulas endocrinas | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C76 | Sitios mal definidos | 6 | 1.5 | 1.0 | 18 | 4.4 | 2.7 |
| 959-972 | Linfomas total | 45 | 11.2 | 8.1 | 52 | 12.8 | 9.4 |
| 965-966 | - Linfomas Hodgkin | 10 | 2.5 | 2.4 | 9 | 2.2 | 2.2 |
| 967-972 | - Linfomas no Hodgkin | 28 | 7.0 | 4.8 | 25 | 6.2 | 4.2 |
| 959 | - Otros sin especificar | 7 | 1.7 | 1.1 | 18 | 4.4 | 3.1 |
| C80 | Sitio primario desconocido | 17 | 4.2 | 2.2 | 23 | 5.7 | 4.0 |
| C00- C80 | Todas las localizaciones | 1503 | 375.6 | 219.8 | 1664 | 411.2 | 244.0 |

*cifras preliminares

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 23: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cienfuegos, 2008*

| Masculino | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C44 | Piel | 213 | 104.2 | 65.4 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 85 | 41.6 | 27.2 |
| C61 | Glándula prostática | 70 | 34.2 | 19.5 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 29 | 14.2 | 10.9 |
| C32 | Laringe | 28 | 13.7 | 10.1 |
| C18 | Colon | 24 | 11.7 | 6.9 |
| C67 | Vejiga urinaria | 18 | 8.8 | 5.1 |
| C20 | Recto | 18 | 8.8 | 5.7 |
| C16 | Estomago | 17 | 8.3 | 5.8 |
| C15 | Esófago | 15 | 7.3 | 5.9 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 619 | 302.8 | 197.9 |

| Femenino | | | | |
|----------|--------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C44 | Piel | 176 | 88.6 | 56.9 |
| C50 | Mama | 97 | 48.8 | 31.7 |
| C53 | Cuello uterino | 50 | 25.2 | 18.9 |
| C18 | Colon | 45 | 22.7 | 15.1 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 41 | 20.6 | 11.9 |
| C25 | Páncreas | 23 | 11.6 | 6.7 |
| C56 | Ovario | 14 | 7.0 | 4.7 |
| C71 | Encéfalo | 11 | 5.5 | 3.8 |
| C54 | Cuerpo uterino | 11 | 5.5 | 3.7 |
| C20 | Recto | 10 | 5.0 | 3.5 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 599 | 301.5 | 196.3 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 24: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Cienfuegos, 2008*

| Masculino | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------|-------|----------|--------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C44 | Piel | 56 | 41.6 | 152 | 463.6 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 19 | 14.1 | 66 | 201.3 |
| C61 | Glándula prostática | 6 | 4.5 | 64 | 195.2 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 15 | 11.1 | 14 | 42.7 |
| C32 | Laringe | 14 | 10.4 | 14 | 42.7 |
| C18 | Colon | 6 | 4.5 | 18 | 54.9 |
| C67 | Vejiga urinaria | 2 | 1.5 | 16 | 48.8 |
| C20 | Recto | 4 | 3.0 | 14 | 42.7 |
| C16 | Estomago | 3 | 2.2 | 14 | 42.7 |
| C15 | Esófago | 6 | 4.5 | 9 | 27.5 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 163 | 121.2 | 445 | 1357.3 |

| Femenino | | | | | |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------|--------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C44 | Piel | 65 | 50.4 | 103 | 297.1 |
| C50 | Mama | 49 | 38.0 | 47 | 135.5 |
| C53 | Cuello uterino | 32 | 24.8 | 18 | 51.9 |
| C18 | Colon | 16 | 12.4 | 28 | 80.8 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 10 | 7.8 | 31 | 89.4 |
| C25 | Páncreas | 3 | 2.3 | 20 | 57.7 |
| C56 | Ovario | 5 | 3.9 | 9 | 26.0 |
| C54 | Cuerpo uterino | 4 | 3.1 | 7 | 20.2 |
| C20 | Recto | 4 | 3.1 | 6 | 17.3 |
| C71 | Encéfalo | 2 | 1.6 | 8 | 23.1 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 234 | 181.5 | 354 | 1020.9 |

*cifras preliminares

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 25: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cienfuegos, 2008*

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C00- C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 5 | 2.5 | 1.5 | 29 | 14.2 | 10.9 |
| C00 | -Labio | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.4 |
| C01 | -Base de la lengua | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0.9 |
| C02 | -Otras partes de la lengua | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.0 | 0.8 |
| C03 | -Encía | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C04 | -Piso de la boca | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1.5 | 1.3 |
| C05 | -Paladar | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2.4 | 2.0 |
| C06 | -Otras de la boca | 2 | 1.0 | 0.6 | 4 | 2.0 | 1.4 |
| C07 | -Parótida | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C08 | -Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C09 | -Amígdala | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0.8 |
| C10 | -Orofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.4 |
| C11 | -Nasofaringe | 2 | 1.0 | 0.6 | 3 | 1.5 | 1.2 |
| C12 | -Seno periforme | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.4 |
| C13 | -Hipofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1.5 | 1.1 |
| C14 | -Otras cavidad bucal | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0.8 |
| C15- C26 | Órganos digestivos | 102 | 51.3 | 33.0 | 95 | 46.5 | 31.0 |
| C15 | -Esófago | 4 | 2.0 | 1.2 | 15 | 7.3 | 5.9 |
| C16 | -Estomago | 9 | 4.5 | 2.8 | 17 | 8.3 | 5.8 |
| C17 | -Intestino delgado | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1.5 | 1.2 |
| C18 | -Colon | 45 | 22.7 | 15.1 | 24 | 11.7 | 6.9 |
| C19 | -Unión recto-sigmoidea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C20 | -Recto | 10 | 5.0 | 3.5 | 18 | 8.8 | 5.7 |
| C21 | -Año y conducto anal | 2 | 1.0 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C22 | -Hígado y conducto biliar | 5 | 2.5 | 2.0 | 10 | 4.9 | 3.4 |
| C23 | -Vesícula biliar | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C24 | -Otras partes y las no especificadas de las vías biliares | 2 | 1.0 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.4 |
| C25 | -Páncreas | 23 | 11.6 | 6.7 | 7 | 3.4 | 2.0 |
| C26 | -Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos | 1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C30- C39 | Sistema respiratorio y órganos intratorácicos | 57 | 28.7 | 17.4 | 122 | 59.7 | 39.7 |
| C30 | -Cavidad nasal-oído medio | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C31 | -Senos paranasales | 1 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.2 |
| C32 | -Laringe | 4 | 2.0 | 1.8 | 28 | 13.7 | 10.1 |
| C33 | -Tráquea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C34 | -Bronquios y pulmón | 41 | 20.6 | 11.9 | 85 | 41.6 | 27.2 |
| C37 | -Timo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C38 | -Corazón-mediastino-pleura | 3 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C39 | -Otros sistema respiratorio | 8 | 4.0 | 2.3 | 8 | 3.9 | 2.3 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 25: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cienfuegos, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|------------------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C40-C41 | Huesos articulaciones y cartílago articular | 5 | 2.5 | 1.8 | 2 | 1.0 | 0.8 |
| C40 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.4 |
| C41 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados | 4 | 2.0 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.4 |
| 980-994 | Leucemias | 10 | 5.0 | 3.5 | 7 | 3.4 | 1.7 |
| 9800 | Leucemias sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9801 | Agudas sin especificar | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9800 | Crónicas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9820 | Linfoblásticas sin especificar | 1 | 0.5 | 0.7 | 3 | 1.5 | 1.0 |
| 9821 | Linfoblásticas agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9823 | Linfoblásticas crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9860 | Mieloides sin especificar | 3 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.4 |
| 9861 | Mieloides agudas | 4 | 2.0 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0.2 |
| 9863 | Mieloides crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9940-9948 | Otras leucemias | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.2 |
| 9732 | Mielomas | 7 | 3.5 | 2.4 | 6 | 2.9 | 2.2 |
| C44 | Piel | 176 | 88.6 | 56.9 | 213 | 104.2 | 65.4 |
| C47 | Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo | 2 | 1.0 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C48 | Peritoneo-retroperitoneo | 3 | 1.5 | 1.2 | 3 | 1.5 | 0.9 |
| C49 | Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C50 | Mama | 97 | 48.8 | 31.7 | 2 | 1.0 | 0.7 |
| C51-C58 | Órganos genitales femeninos. | 81 | 40.8 | 28.8 | - | - | - |
| C51 | -Vulva | 2 | 1.0 | 0.8 | - | - | - |
| C52 | -Vagina | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C53 | -Cuello uterino | 50 | 25.2 | 18.9 | - | - | - |
| C54 | -Cuerpo uterino | 11 | 5.5 | 3.7 | - | - | - |
| C55 | -Útero sin especificar | 4 | 2.0 | 1.0 | - | - | - |
| C56 | -Ovario | 14 | 7.0 | 4.7 | - | - | - |
| C57 | -Otros órganos genitales femeninos y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C58 | -Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C60-C63 | Órganos genitales masculinos | - | - | - | 73 | 35.7 | 20.4 |
| C60 | -Pene | - | - | - | 2 | 1.0 | 0.6 |
| C61 | -Glándula prostática | - | - | - | 70 | 34.2 | 19.5 |
| C62 | -Testículo | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C63 | Órganos genitales masculinos y los no especificados | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.4 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 25 : Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Cienfuegos, 2008* (continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|----------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C64-C68 | Tracto urinario | 13 | 6.5 | 4.2 | 23 | 11.2 | 7.0 |
| C64 | -Riñón | 4 | 2.0 | 1.8 | 5 | 2.4 | 1.9 |
| C65 | -Pelvis renal | 2 | 1.0 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C66 | -Uréter | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C67 | -Vejiga urinaria | 7 | 3.5 | 1.8 | 18 | 8.8 | 5.1 |
| C68 | -Otros órganos urinarios y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C69-C72 | Encéfalo, ojo, otros SNC | 14 | 7.0 | 4.8 | 13 | 6.4 | 6.4 |
| C69 | -Ojo y anexos | 3 | 1.5 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.3 |
| C70 | -Meninges | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C71 | -Encéfalo | 11 | 5.5 | 3.8 | 12 | 5.9 | 6.2 |
| C72 | -Medula espinal-nervios | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C73-C75 | Tiroides, y otras glándulas endocrinas | 9 | 4.5 | 4.0 | 7 | 3.4 | 2.7 |
| C73 | -Glándula tiroides | 8 | 4.0 | 3.3 | 6 | 2.9 | 2.3 |
| C74 | -Glándula suprarrenal | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| C75 | -Otras glándulas endocrinas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C76 | Sitios mal definidos | 7 | 3.5 | 1.9 | 7 | 3.4 | 3.2 |
| 959-972 | Linfomas total | 4 | 2.0 | 1.0 | 6 | 2.9 | 2.7 |
| 965-966 | - Linfomas Hodgkin | 1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 967-972 | - Linfomas no Hodgkin | 2 | 1.0 | 0.5 | 4 | 2.0 | 1.9 |
| 959 | - Otros sin especificar | 1 | 0.5 | 0.3 | 2 | 1.0 | 0.8 |
| C80 | Sitio primario desconocido | 7 | 3.5 | 2.2 | 11 | 5.4 | 3.1 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 599 | 301.5 | 196.3 | 619 | 302.8 | 197.9 |

*cifras preliminares

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 26: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Sancti Spiritus, 2008*

| Masculino | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C44 | Piel | 211 | 89.6 | 54.9 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 114 | 48.4 | 29.9 |
| C61 | Glándula prostática | 88 | 37.4 | 18.4 |
| C67 | Vejiga urinaria | 41 | 17.4 | 10.6 |
| C32 | Laringe | 39 | 16.6 | 11.8 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 34 | 14.4 | 9.5 |
| C18 | Colon | 31 | 13.2 | 6.6 |
| C16 | Estomago | 23 | 9.8 | 5.7 |
| 959-964 | Linfomas | 15 | 6.4 | 5.6 |
| C71 | Encéfalo | 15 | 6.4 | 5.3 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 711 | 302.0 | 188.2 |

| Femenino | | | | |
|----------|--------------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C44 | Piel | 169 | 74.1 | 44.1 |
| C50 | Mama | 88 | 38.6 | 23.2 |
| C53 | Cuello uterino | 71 | 31.1 | 19.5 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 42 | 18.4 | 10.6 |
| C18 | Colon | 32 | 14.0 | 7.7 |
| C73 | Glándula tiroides | 25 | 11.0 | 8.0 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 17 | 7.5 | 5.0 |
| 980-994 | Leucemias | 17 | 7.5 | 5.4 |
| C54 | Cuerpo uterino | 16 | 7.0 | 4.9 |
| C25 | Páncreas | 13 | 5.7 | 3.7 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 608 | 266.6 | 164.9 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 27: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Sancti Spiritus, 2008*

| Masculino | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------|-------|----------|--------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C44 | Piel | 64 | 41.9 | 147 | 350.6 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 25 | 16.4 | 89 | 212.3 |
| C61 | Glándula prostática | 7 | 4.6 | 81 | 193.2 |
| C67 | Vejiga urinaria | 13 | 8.5 | 28 | 66.8 |
| C32 | Laringe | 16 | 10.5 | 22 | 52.5 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 12 | 7.9 | 21 | 50.1 |
| C18 | Colon | 5 | 3.3 | 25 | 59.6 |
| C16 | Estomago | 4 | 2.6 | 18 | 42.9 |
| 959-964 | Linfomas | 9 | 5.9 | 5 | 11.9 |
| C71 | Encéfalo | 9 | 5.9 | 5 | 11.9 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 207 | 135.5 | 495 | 1180.5 |

| Femenino | | | | | |
|----------|--------------------------------|-------|-------|----------|-------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C44 | Piel | 70 | 47.3 | 99 | 233.8 |
| C50 | Mama | 36 | 24.3 | 52 | 122.8 |
| C53 | Cuello uterino | 57 | 38.5 | 13 | 30.7 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 7 | 4.7 | 35 | 82.6 |
| C18 | Colon | 8 | 5.4 | 24 | 56.7 |
| C73 | Glándula tiroides | 19 | 12.8 | 6 | 14.2 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 7 | 4.7 | 10 | 23.6 |
| 980-994 | Leucemias | 9 | 6.1 | 8 | 18.9 |
| C54 | Cuerpo uterino | 4 | 2.7 | 12 | 28.3 |
| C25 | Páncreas | 2 | 1.4 | 11 | 26.0 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 250 | 169.0 | 354 | 835.9 |

*cifras preliminares

tasa: tasa especifica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 28: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Sancti Spiritus, 2008*

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C00- C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 17 | 7.5 | 5.0 | 34 | 14.4 | 9.5 |
| C00 | -Labio | 1 | 0.4 | 0.4 | 5 | 2.1 | 1.5 |
| C01 | -Base de la lengua | 1 | 0.4 | 0.3 | 3 | 1.3 | 1.1 |
| C02 | -Otras partes de la lengua | 4 | 1.8 | 1.1 | 8 | 3.4 | 2.1 |
| C03 | -Encía | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C04 | -Piso de la boca | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.1 |
| C05 | -Paladar | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C06 | -Otras de la boca | 1 | 0.4 | 0.4 | 3 | 1.3 | 0.8 |
| C07 | -Parótida | 2 | 0.9 | 0.7 | 2 | 0.8 | 0.2 |
| C08 | -Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas | 2 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C09 | -Amígdala | 1 | 0.4 | 0.4 | 4 | 1.7 | 1.1 |
| C10 | -Orofaringe | 2 | 0.9 | 0.5 | 6 | 2.5 | 1.9 |
| C11 | -Nasofaringe | 2 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.8 |
| C12 | -Seno periforme | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C13 | -Hipofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C14 | -Otras cavidad bucal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C15- C26 | Órganos digestivos | 86 | 37.7 | 21.9 | 94 | 39.9 | 23.4 |
| C15 | -Esófago | 4 | 1.8 | 1.0 | 8 | 3.4 | 2.1 |
| C16 | -Estomago | 5 | 2.2 | 1.2 | 23 | 9.8 | 5.7 |
| C17 | -Intestino delgado | 6 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C18 | -Colon | 32 | 14.0 | 7.7 | 31 | 13.2 | 6.6 |
| C19 | -Unión recto-sigmoidea | 5 | 2.2 | 1.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C20 | -Recto | 11 | 4.8 | 3.3 | 12 | 5.1 | 3.6 |
| C21 | -Año y conducto anal | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C22 | -Hígado y conducto biliar | 5 | 2.2 | 1.5 | 6 | 2.5 | 1.8 |
| C23 | -Vesícula biliar | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C24 | -Otras partes y las no especificadas de las vías biliares | 5 | 2.2 | 1.1 | 3 | 1.3 | 0.7 |
| C25 | -Páncreas | 13 | 5.7 | 3.7 | 9 | 3.8 | 2.6 |
| C26 | -Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C30- C39 | Sistema respiratorio y órganos intratorácicos | 47 | 20.6 | 12.0 | 161 | 68.4 | 43.4 |
| C30 | -Cavidad nasal-oído medio | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 0.5 |
| C31 | -Senos paranasales | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.2 |
| C32 | -Laringe | 2 | 0.9 | 0.7 | 39 | 16.6 | 11.8 |
| C33 | -Tráquea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C34 | -Bronquios y pulmón | 42 | 18.4 | 10.6 | 114 | 48.4 | 29.9 |
| C37 | -Timo | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C38 | -Corazón-mediastino-pleura | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C39 | -Otros sistema respiratorio | 3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.7 | 0.9 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 28: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Sancti Spiritus, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|------------------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C40-C41 | Huesos articulaciones y cartílago articular | 2 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.7 | 1.4 |
| C40 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros | 1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C41 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados | 1 | 0.4 | 0.4 | 3 | 1.3 | 1.1 |
| 980-994 | Leucemias | 17 | 7.5 | 5.4 | 14 | 5.9 | 5.6 |
| 9800 | Leucemias sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9801 | Agudas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9800 | Crónicas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9820 | Linfoblásticas sin especificar | 3 | 1.3 | 0.8 | 3 | 1.3 | 2.3 |
| 9821 | Linfoblásticas agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9823 | Linfoblásticas crónicas | 2 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9860 | Mieloides sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| 9861 | Mieloides agudas | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.6 |
| 9863 | Mieloides crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9940-9948 | Otras leucemias | 11 | 4.8 | 4.0 | 9 | 3.8 | 2.5 |
| 9732 | Mielomas | 2 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.3 |
| C44 | Piel | 169 | 74.1 | 44.1 | 211 | 89.6 | 54.9 |
| C47 | Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C48 | Peritoneo-retroperitoneo | 3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C49 | Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 0.9 |
| C50 | Mama | 88 | 38.6 | 23.2 | 2 | 0.8 | 0.3 |
| C51-C58 | Órganos genitales femeninos. | 106 | 46.5 | 29.1 | - | - | - |
| C51 | -Vulva | 5 | 2.2 | 1.5 | - | - | - |
| C52 | -Vagina | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C53 | -Cuello uterino | 71 | 31.1 | 19.5 | - | - | - |
| C54 | -Cuerpo uterino | 16 | 7.0 | 4.9 | - | - | - |
| C55 | -Útero sin especificar | 6 | 2.6 | 1.6 | - | - | - |
| C56 | -Ovario | 8 | 3.5 | 1.9 | - | - | - |
| C57 | -Otros órganos genitales femeninos y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C58 | -Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C60-C63 | Órganos genitales masculinos | - | - | - | 93 | 39.5 | 19.9 |
| C60 | -Pene | - | - | - | 4 | 1.7 | 1.0 |
| C61 | -Glándula prostática | - | - | - | 88 | 37.4 | 18.4 |
| C62 | -Testículo | - | - | - | 1 | 0.4 | 0.7 |
| C63 | Órganos genitales masculinos y los no especificados | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 28: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Sancti Spiritus, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|----------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C64-C68 | Tracto urinario | 15 | 6.6 | 3.7 | 49 | 20.8 | 13.3 |
| C64 | -Riñón | 4 | 1.8 | 1.0 | 5 | 2.1 | 1.8 |
| C65 | -Pelvis renal | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.3 |
| C66 | -Uréter | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 0.8 |
| C67 | -Vejiga urinaria | 11 | 4.8 | 2.8 | 41 | 17.4 | 10.6 |
| C68 | -Otros órganos urinarios y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C69-C72 | Encéfalo, ojo, otros SNC | 14 | 6.1 | 4.6 | 18 | 7.6 | 6.2 |
| C69 | -Ojo y anexos | 1 | 0.4 | 0.3 | 3 | 1.3 | 1.0 |
| C70 | -Meninges | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C71 | -Encéfalo | 13 | 5.7 | 4.4 | 15 | 6.4 | 5.3 |
| C72 | -Medula espinal-nervios | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C73-C75 | Tiroides, y otras glándulas endocrinas | 25 | 11.0 | 8.0 | 7 | 3.0 | 2.5 |
| C73 | -Glándula tiroides | 25 | 11.0 | 8.0 | 5 | 2.1 | 2.0 |
| C74 | -Glándula suprarrenal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C75 | -Otras glándulas endocrinas | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 0.5 |
| C76 | Sitios mal definidos | 4 | 1.8 | 2.8 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| 959-972 | Linfomas total | 11 | 4.8 | 3.4 | 15 | 6.4 | 5.6 |
| 965-966 | - Linfomas Hodgkin | 2 | 0.9 | 0.6 | 3 | 1.3 | 0.8 |
| 967-972 | - Linfomas no Hodgkin | 3 | 1.3 | 1.4 | 7 | 3.0 | 2.9 |
| 959 | - Otros sin especificar | 6 | 2.6 | 1.4 | 5 | 2.1 | 2.0 |
| C80 | Sitio primario desconocido | 2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.7 | 1.1 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 608 | 266.6 | 164.9 | 711 | 302.0 | 188.2 |

*cifras preliminares

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 29: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Ciego de Ávila, 2008*

| Masculino | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C61 | Glándula prostática | 118 | 55.2 | 31.5 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 105 | 49.1 | 32.8 |
| C44 | Piel | 61 | 28.5 | 18.9 |
| C32 | Laringe | 30 | 14.0 | 10.2 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 29 | 13.6 | 10.7 |
| C18 | Colon | 25 | 11.7 | 7.2 |
| C67 | Vejiga urinaria | 25 | 11.7 | 7.6 |
| 959-964 | Linfomas | 21 | 9.8 | 9.1 |
| C15 | Esófago | 20 | 9.4 | 6.9 |
| 980-994 | Leucemias | 15 | 7.0 | 4.9 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 544 | 254.5 | 169.7 |

| Femenino | | | | |
|----------|--------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C50 | Mama | 99 | 48.1 | 34.4 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 58 | 28.2 | 17.3 |
| C53 | Cuello uterino | 57 | 27.7 | 19.8 |
| C44 | Piel | 56 | 27.2 | 17.2 |
| C18 | Colon | 23 | 11.2 | 6.2 |
| 959-964 | Linfomas | 11 | 5.3 | 3.8 |
| C16 | Estomago | 10 | 4.9 | 2.6 |
| C73 | Glándula tiroides | 9 | 4.4 | 3.3 |
| C32 | Laringe | 9 | 4.4 | 3.4 |
| C71 | Encéfalo | 8 | 3.9 | 3.3 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 411 | 199.6 | 133.6 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000.

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 30: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Ciego de Ávila, 2008*

| Masculino | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------|------|----------|--------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C61 | Glándula prostática | 6 | 4.2 | 111 | 342.8 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 27 | 18.9 | 78 | 240.9 |
| C44 | Piel | 15 | 10.5 | 46 | 142.1 |
| C32 | Laringe | 10 | 7.0 | 20 | 61.8 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 12 | 8.4 | 17 | 52.5 |
| C18 | Colon | 6 | 4.2 | 19 | 58.7 |
| C67 | Vejiga urinaria | 3 | 2.1 | 22 | 68.0 |
| C15 | Esófago | 10 | 7.0 | 10 | 30.9 |
| 959-964 | Linfomas | 7 | 4.9 | 13 | 40.2 |
| C25 | Páncreas | 5 | 3.5 | 9 | 27.8 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 133 | 93.2 | 408 | 1260.2 |

| Femenino | | | | | |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------|-------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C50 | Mama | 60 | 44.1 | 39 | 116.6 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 16 | 11.7 | 42 | 125.6 |
| C53 | Cuello uterino | 47 | 34.5 | 10 | 29.9 |
| C44 | Piel | 17 | 12.5 | 39 | 116.6 |
| C18 | Colon | 4 | 2.9 | 19 | 56.8 |
| 959-964 | Linfomas | 5 | 3.7 | 6 | 17.9 |
| C16 | Estomago | 1 | 0.7 | 9 | 26.9 |
| C73 | Glándula tiroides | 7 | 5.1 | 2 | 6.0 |
| C32 | Laringe | 2 | 1.5 | 7 | 20.9 |
| C71 | Encéfalo | 6 | 4.4 | 2 | 6.0 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 185 | 135.9 | 225 | 672.9 |

*cifras preliminares

tasa: tasa especifica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 31: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Ciego de Ávila, 2008*

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C00- C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 7 | 3.4 | 2.2 | 29 | 13.6 | 10.7 |
| C00 | -Labio | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2.3 | 1.8 |
| C01 | -Base de la lengua | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2.3 | 1.9 |
| C02 | -Otras partes de la lengua | 4 | 1.9 | 1.2 | 7 | 3.3 | 2.8 |
| C03 | -Encía | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C04 | -Piso de la boca | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.9 | 0.9 |
| C05 | -Paladar | 1 | 0.5 | 0.4 | 3 | 1.4 | 1.2 |
| C06 | -Otras de la boca | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.9 | 0.9 |
| C07 | -Parótida | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C08 | -Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C09 | -Amígdala | 1 | 0.5 | 0.3 | 3 | 1.4 | 1.0 |
| C10 | -Orofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.3 |
| C11 | -Nasofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C12 | -Seno periforme | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C13 | -Hipofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C14 | -Otras cavidad bucal | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.2 |
| C15- C26 | Órganos digestivos | 57 | 27.7 | 16.0 | 97 | 45.4 | 30.6 |
| C15 | -Esófago | 3 | 1.5 | 0.8 | 20 | 9.4 | 6.9 |
| C16 | -Estomago | 10 | 4.9 | 2.6 | 11 | 5.1 | 3.4 |
| C17 | -Intestino delgado | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C18 | -Colon | 23 | 11.2 | 6.2 | 25 | 11.7 | 7.2 |
| C19 | -Unión recto-sigmoidea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C20 | -Recto | 5 | 2.4 | 1.7 | 10 | 4.7 | 3.7 |
| C21 | -Año y conducto anal | 5 | 2.4 | 1.9 | 1 | 0.5 | 0.3 |
| C22 | -Hígado y conducto biliar | 4 | 1.9 | 1.0 | 12 | 5.6 | 4.1 |
| C23 | -Vesícula biliar | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.2 |
| C24 | -Otras partes y las no especificadas de las vías biliares | 2 | 1.0 | 0.8 | 2 | 0.9 | 0.6 |
| C25 | -Páncreas | 5 | 2.4 | 1.5 | 14 | 6.5 | 4.5 |
| C26 | -Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.2 |
| C30- C39 | Sistema respiratorio y órganos intratorácicos | 74 | 35.9 | 22.9 | 137 | 64.1 | 43.8 |
| C30 | -Cavidad nasal-oído medio | 6 | 2.9 | 2.1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| C31 | -Senos paranasales | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C32 | -Laringe | 9 | 4.4 | 3.4 | 30 | 14.0 | 10.2 |
| C33 | -Tráquea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C34 | -Bronquios y pulmón | 58 | 28.2 | 17.3 | 105 | 49.1 | 32.8 |
| C37 | -Timo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C38 | -Corazón-mediastino-pleura | 1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C39 | -Otros sistema respiratorio | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.5 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 31: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Ciego de Ávila, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|------------------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C40-C41 | Huesos articulaciones y cartílago articular | 1 | 0.5 | 0.3 | 2 | 0.9 | 0.8 |
| C40 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C41 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.9 | 0.8 |
| 980-994 | Leucemias | 5 | 2.4 | 2.3 | 15 | 7.0 | 4.9 |
| 9800 | Leucemias sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9801 | Agudas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1.1 |
| 9800 | Crónicas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9820 | Linfoblásticas sin especificar | 1 | 0.5 | 1.1 | 3 | 1.4 | 1.1 |
| 9821 | Linfoblásticas agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9823 | Linfoblásticas crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9860 | Mieloides sin especificar | 2 | 1.0 | 0.8 | 2 | 0.9 | 0.3 |
| 9861 | Mieloides agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9863 | Mieloides crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9940-9948 | Otras leucemias | 2 | 1.0 | 0.4 | 9 | 4.2 | 2.6 |
| 9732 | Mielomas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C44 | Piel | 56 | 27.2 | 17.2 | 61 | 28.5 | 18.9 |
| C47 | Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C48 | Peritoneo-retroperitoneo | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.1 |
| C49 | Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos | 1 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.3 |
| C50 | Mama | 99 | 48.1 | 34.4 | 3 | 1.4 | 1.4 |
| C51-C58 | Órganos genitales femeninos. | 73 | 35.5 | 25.1 | - | - | - |
| C51 | -Vulva | 2 | 1.0 | 0.4 | - | - | - |
| C52 | -Vagina | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
| C53 | -Cuello uterino | 57 | 27.7 | 19.8 | - | - | - |
| C54 | -Cuerpo uterino | 4 | 1.9 | 1.7 | - | - | - |
| C55 | -Útero sin especificar | 3 | 1.5 | 0.9 | - | - | - |
| C56 | -Ovario | 6 | 2.9 | 2.2 | - | - | - |
| C57 | -Otros órganos genitales femeninos y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C58 | -Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C60-C63 | Órganos genitales masculinos | - | - | - | 124 | 58.0 | 33.3 |
| C60 | -Pene | - | - | - | 5 | 2.3 | 1.6 |
| C61 | -Glándula prostática | - | - | - | 118 | 55.2 | 31.5 |
| C62 | -Testículo | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.4 |
| C63 | Órganos genitales masculinos y los no especificados | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 31: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Ciego de Ávila, 2008* (continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|----------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C64-C68 | Tracto urinario | 7 | 3.4 | 2.2 | 29 | 13.6 | 8.9 |
| C64 | -Riñón | 2 | 1.0 | 0.6 | 3 | 1.4 | 1.1 |
| C65 | -Pelvis renal | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.4 |
| C66 | -Uréter | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C67 | -Vejiga urinaria | 4 | 1.9 | 1.2 | 25 | 11.7 | 7.6 |
| C68 | -Otros órganos urinarios y los no especificados | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C69-C72 | Encéfalo, ojo, otros SNC | 9 | 4.4 | 3.7 | 12 | 5.6 | 4.0 |
| C69 | -Ojo y anexos | 1 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.9 | 0.4 |
| C70 | -Meninges | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C71 | -Encéfalo | 8 | 3.9 | 3.3 | 10 | 4.7 | 3.7 |
| C72 | -Medula espinal-nervios | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C73-C75 | Tiroides, y otras glándulas endocrinas | 9 | 4.4 | 3.3 | 3 | 1.4 | 1.1 |
| C73 | -Glándula tiroides | 9 | 4.4 | 3.3 | 3 | 1.4 | 1.1 |
| C74 | -Glándula suprarrenal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C75 | -Otras glándulas endocrinas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C76 | Sitios mal definidos | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 2.3 | 1.6 |
| 959-972 | Linfomas total | 11 | 5.3 | 3.8 | 21 | 9.8 | 9.1 |
| 965-966 | - Linfomas Hodgkin | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1.4 | 1.9 |
| 967-972 | - Linfomas no Hodgkin | 5 | 2.4 | 1.6 | 8 | 3.7 | 3.1 |
| 959 | - Otros sin especificar | 6 | 2.9 | 2.3 | 10 | 4.7 | 4.2 |
| C80 | Sitio primario desconocido | 2 | 1.0 | 0.7 | 4 | 1.9 | 1.2 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 411 | 199.6 | 133.6 | 544 | 254.5 | 169.7 |

*cifras preliminares

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 32: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Camagüey, 2008*

| Masculino | | | | |
|-----------|--------------------------------|------|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C44 | Piel | 292 | 74.3 | 50.7 |
| C61 | Glándula prostática | 168 | 42.7 | 24.6 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 164 | 41.7 | 29.0 |
| C32 | Laringe | 65 | 16.5 | 11.9 |
| C18 | Colon | 49 | 12.5 | 7.8 |
| C67 | Vejiga urinaria | 48 | 12.2 | 8.2 |
| 959-964 | Linfomas | 40 | 10.2 | 9.2 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 39 | 9.9 | 7.1 |
| C16 | Estomago | 32 | 8.1 | 5.7 |
| 980-994 | Leucemias | 24 | 6.1 | 5.6 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 1098 | 279.3 | 193.6 |

| Femenino | | | | |
|----------|--------------------------|------|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C44 | Piel | 224 | 57.7 | 35.6 |
| C50 | Mama | 185 | 47.6 | 32.1 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 106 | 27.3 | 18.0 |
| C53 | Cuello uterino | 83 | 21.4 | 14.2 |
| C18 | Colon | 68 | 17.5 | 10.4 |
| C54 | Cuerpo uterino | 43 | 11.1 | 7.6 |
| 959-964 | Linfomas | 30 | 7.7 | 5.0 |
| 980-994 | Leucemias | 23 | 5.9 | 4.8 |
| C25 | Páncreas | 22 | 5.7 | 3.6 |
| C67 | Vejiga urinaria | 20 | 5.1 | 3.3 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 1028 | 264.6 | 173.5 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 33: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Camagüey, 2008*

| Masculino | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------|-------|----------|--------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C44 | Piel | 81 | 30.9 | 211 | 346.8 |
| C61 | Glándula prostática | 9 | 3.4 | 159 | 261.4 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 34 | 13.0 | 130 | 213.7 |
| C32 | Laringe | 15 | 5.7 | 50 | 82.2 |
| C18 | Colon | 15 | 5.7 | 34 | 55.9 |
| C67 | Vejiga urinaria | 5 | 1.9 | 43 | 70.7 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 20 | 7.6 | 19 | 31.2 |
| 959-964 | Linfomas | 19 | 7.2 | 17 | 27.9 |
| C16 | Estomago | 5 | 1.9 | 27 | 44.4 |
| C15 | Esófago | 9 | 3.4 | 14 | 23.0 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 278 | 105.9 | 806 | 1324.9 |

| Femenino | | | | | |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------|-------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C44 | Piel | 88 | 34.1 | 136 | 209.8 |
| C50 | Mama | 91 | 35.3 | 94 | 145.0 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 38 | 14.7 | 68 | 104.9 |
| C53 | Cuello uterino | 66 | 25.6 | 17 | 26.2 |
| C18 | Colon | 14 | 5.4 | 54 | 83.3 |
| C54 | Cuerpo uterino | 10 | 3.9 | 33 | 50.9 |
| 959-964 | Linfomas | 14 | 5.4 | 16 | 24.7 |
| C25 | Páncreas | 4 | 1.6 | 18 | 27.8 |
| 980-994 | Leucemias | 8 | 3.1 | 13 | 20.1 |
| C67 | Vejiga urinaria | 4 | 1.6 | 16 | 24.7 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 424 | 164.5 | 597 | 921.0 |

*cifras preliminares

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 34: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Camagüey, 2008*

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C00- C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 19 | 4.9 | 3.0 | 39 | 9.9 | 7.1 |
| C00 | -Labio | 1 | 0.3 | 0.2 | 3 | 0.8 | 0.6 |
| C01 | -Base de la lengua | 1 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.0 | 0.7 |
| C02 | -Otras partes de la lengua | 5 | 1.3 | 0.7 | 3 | 0.8 | 0.6 |
| C03 | -Encía | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C04 | -Piso de la boca | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 0.8 |
| C05 | -Paladar | 1 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.0 | 0.6 |
| C06 | -Otras de la boca | 4 | 1.0 | 0.7 | 6 | 1.5 | 1.2 |
| C07 | -Parótida | 2 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 |
| C08 | -Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C09 | -Amígdala | 3 | 0.8 | 0.6 | 3 | 0.8 | 0.6 |
| C10 | -Orofaringe | 1 | 0.3 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.4 |
| C11 | -Nasofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0.9 |
| C12 | -Seno periforme | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C13 | -Hipofaringe | 1 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.8 | 0.7 |
| C14 | -Otras cavidad bucal | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.4 |
| C15- C26 | Órganos digestivos | 157 | 40.4 | 24.0 | 159 | 40.4 | 26.9 |
| C15 | -Esófago | 6 | 1.5 | 1.1 | 23 | 5.9 | 4.4 |
| C16 | -Estomago | 16 | 4.1 | 2.7 | 32 | 8.1 | 5.7 |
| C17 | -Intestino delgado | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 |
| C18 | -Colon | 68 | 17.5 | 10.4 | 49 | 12.5 | 7.8 |
| C19 | -Unión recto-sigmoidea | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.2 |
| C20 | -Recto | 15 | 3.9 | 2.1 | 20 | 5.1 | 3.2 |
| C21 | -Año y conducto anal | 3 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C22 | -Hígado y conducto biliar | 13 | 3.3 | 1.8 | 13 | 3.3 | 2.6 |
| C23 | -Vesícula biliar | 7 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C24 | -Otras partes y las no especificadas de las vías biliares | 5 | 1.3 | 0.7 | 4 | 1.0 | 0.6 |
| C25 | -Páncreas | 22 | 5.7 | 3.6 | 15 | 3.8 | 2.3 |
| C26 | -Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C30- C39 | Sistema respiratorio y órganos intratorácicos | 126 | 32.4 | 22.1 | 241 | 61.3 | 42.9 |
| C30 | -Cavidad nasal-oído medio | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.4 |
| C31 | -Senos paranasales | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C32 | -Laringe | 7 | 1.8 | 1.3 | 65 | 16.5 | 11.9 |
| C33 | -Tráquea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C34 | -Bronquios y pulmón | 106 | 27.3 | 18.0 | 164 | 41.7 | 29.0 |
| C37 | -Timo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C38 | -Corazón-mediastino-pleura | 7 | 1.8 | 1.8 | 3 | 0.8 | 0.6 |
| C39 | -Otros sistema respiratorio | 4 | 1.0 | 0.7 | 7 | 1.8 | 1.2 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 34: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Camagüey, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|------------------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C40-C41 | Huesos articulaciones y cartílago articular | 13 | 3.3 | 2.6 | 10 | 2.5 | 2.7 |
| C40 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros | 8 | 2.1 | 1.6 | 4 | 1.0 | 1.0 |
| C41 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados | 5 | 1.3 | 1.0 | 6 | 1.5 | 1.7 |
| 980-994 | Leucemias | 23 | 5.9 | 4.8 | 24 | 6.1 | 5.6 |
| 9800 | Leucemias sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9801 | Agudas sin especificar | 2 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9800 | Crónicas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9820 | Linfoblásticas sin especificar | 2 | 0.5 | 0.3 | 8 | 2.0 | 2.6 |
| 9821 | Linfoblásticas agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9823 | Linfoblásticas crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9860 | Mieloides sin especificar | 3 | 0.8 | 0.6 | 3 | 0.8 | 0.6 |
| 9861 | Mieloides agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 9863 | Mieloides crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9940-9948 | Otras leucemias | 16 | 4.1 | 3.2 | 12 | 3.1 | 2.2 |
| 9732 | Mielomas | 4 | 1.0 | 0.9 | 4 | 1.0 | 0.9 |
| C44 | Piel | 224 | 57.7 | 35.6 | 292 | 74.3 | 50.7 |
| C47 | Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo | 2 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C48 | Peritoneo-retroperitoneo | 5 | 1.3 | 0.8 | 2 | 0.5 | 0.4 |
| C49 | Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| C50 | Mama | 185 | 47.6 | 32.1 | 3 | 0.8 | 0.6 |
| C51-C58 | Órganos genitales femeninos. | 162 | 41.7 | 27.4 | - | - | - |
| C51 | -Vulva | 4 | 1.0 | 0.8 | - | - | - |
| C52 | -Vagina | 1 | 0.3 | 0.2 | - | - | - |
| C53 | -Cuello uterino | 83 | 21.4 | 14.2 | - | - | - |
| C54 | -Cuerpo uterino | 43 | 11.1 | 7.6 | - | - | - |
| C55 | -Útero sin especificar | 10 | 2.6 | 1.2 | - | - | - |
| C56 | -Ovario | 19 | 4.9 | 3.4 | - | - | - |
| C57 | -Otros órganos genitales femeninos y los no especificados | 2 | 0.5 | 0.3 | - | - | - |
| C58 | -Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C60-C63 | Órganos genitales masculinos | - | - | - | 176 | 44.8 | 26.2 |
| C60 | -Pene | - | - | - | 7 | 1.8 | 1.2 |
| C61 | -Glándula prostática | - | - | - | 168 | 42.7 | 24.6 |
| C62 | -Testículo | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.6 |
| C63 | Órganos genitales masculinos y los no especificados | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 34: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Camagüey, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|----------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C64-C68 | Tracto urinario | 27 | 6.9 | 4.5 | 64 | 16.3 | 11.9 |
| C64 | -Riñón | 6 | 1.5 | 1.2 | 15 | 3.8 | 3.4 |
| C65 | -Pelvis renal | 1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.4 |
| C66 | -Uréter | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C67 | -Vejiga urinaria | 20 | 5.1 | 3.3 | 48 | 12.2 | 8.2 |
| C68 | -Otros órganos urinarios y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C69-C72 | Encéfalo, ojo, otros SNC | 22 | 5.7 | 4.7 | 25 | 6.4 | 5.3 |
| C69 | -Ojo y anexos | 3 | 0.8 | 0.6 | 5 | 1.3 | 1.2 |
| C70 | -Meninges | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C71 | -Encéfalo | 17 | 4.4 | 3.8 | 20 | 5.1 | 4.2 |
| C72 | -Medula espinal-nervios | 1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C73-C75 | Tiroides, y otras glándulas endocrinas | 16 | 4.1 | 3.8 | 6 | 1.5 | 1.2 |
| C73 | -Glándula tiroides | 15 | 3.9 | 3.5 | 6 | 1.5 | 1.2 |
| C74 | -Glándula suprarrenal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C75 | -Otras glándulas endocrinas | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C76 | Sitios mal definidos | 2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 0.5 | 0.7 |
| 959-972 | Linfomas total | 30 | 7.7 | 5.0 | 40 | 10.2 | 9.2 |
| 965-966 | - Linfomas Hodgkin | 9 | 2.3 | 1.4 | 11 | 2.8 | 2.9 |
| 967-972 | - Linfomas no Hodgkin | 11 | 2.8 | 2.0 | 22 | 5.6 | 5.2 |
| 959 | - Otros sin especificar | 10 | 2.6 | 1.7 | 7 | 1.8 | 1.3 |
| C80 | Sitio primario desconocido | 10 | 2.6 | 1.8 | 9 | 2.3 | 1.6 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 1028 | 264.6 | 173.5 | 1098 | 279.3 | 193.6 |

*cifras preliminares

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 35: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Las Tunas, 2008*

| Masculino | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C34 | Bronquios y pulmón | 104 | 38.3 | 27.1 |
| C61 | Glándula prostática | 91 | 33.5 | 21.0 |
| C44 | Piel | 63 | 23.2 | 16.0 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 32 | 11.8 | 8.6 |
| C18 | Colon | 31 | 11.4 | 8.5 |
| C32 | Laringe | 29 | 10.7 | 7.7 |
| C67 | Vejiga urinaria | 25 | 9.2 | 5.7 |
| C15 | Esófago | 25 | 9.2 | 6.8 |
| 959-964 | Linfomas | 22 | 8.1 | 6.8 |
| C16 | Estomago | 17 | 6.3 | 4.2 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 541 | 199.3 | 140.4 |

| Femenino | | | | |
|----------|--------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C50 | Mama | 111 | 42.1 | 30.2 |
| C53 | Cuello uterino | 84 | 31.9 | 22.3 |
| C44 | Piel | 69 | 26.2 | 17.6 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 63 | 23.9 | 16.7 |
| C18 | Colon | 32 | 12.1 | 7.6 |
| C54 | Cuerpo uterino | 23 | 8.7 | 6.1 |
| 959-964 | Linfomas | 16 | 6.1 | 4.7 |
| 980-994 | Leucemias | 15 | 5.7 | 5.3 |
| C56 | Ovario | 15 | 5.7 | 4.5 |
| C25 | Páncreas | 15 | 5.7 | 3.5 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 543 | 206.1 | 145.2 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 36: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Las Tunas, 2008*

| Masculino | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------|------|----------|-------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C34 | Bronquios y pulmón | 27 | 14.8 | 77 | 194.5 |
| C61 | Glándula prostática | 8 | 4.4 | 83 | 209.6 |
| C44 | Piel | 20 | 11.0 | 42 | 106.1 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 13 | 7.1 | 19 | 48.0 |
| C18 | Colon | 4 | 2.2 | 27 | 68.2 |
| C32 | Laringe | 6 | 3.3 | 23 | 58.1 |
| C67 | Vejiga urinaria | 1 | 0.5 | 24 | 60.6 |
| C15 | Esófago | 10 | 5.5 | 14 | 35.4 |
| 959-964 | Linfomas | 8 | 4.4 | 12 | 30.3 |
| C16 | Estomago | 3 | 1.6 | 14 | 35.4 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 140 | 77.0 | 392 | 990.0 |

| Femenino | | | | | |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------|-------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C50 | Mama | 66 | 37.4 | 45 | 113.5 |
| C53 | Cuello uterino | 72 | 40.8 | 12 | 30.3 |
| C44 | Piel | 31 | 17.6 | 38 | 95.9 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 18 | 10.2 | 45 | 113.5 |
| C18 | Colon | 7 | 4.0 | 25 | 63.1 |
| C54 | Cuerpo uterino | 6 | 3.4 | 17 | 42.9 |
| 959-964 | Linfomas | 9 | 5.1 | 7 | 17.7 |
| C56 | Ovario | 9 | 5.1 | 6 | 15.1 |
| C25 | Páncreas | 3 | 1.7 | 12 | 30.3 |
| C73 | Glándula tiroides | 11 | 6.2 | 2 | 5.0 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 265 | 150.3 | 273 | 688.9 |

*cifras preliminares

tasa: tasa especifica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 37: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Las Tunas, 2008*

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C00- C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 11 | 4.2 | 3.0 | 32 | 11.8 | 8.6 |
| C00 | -Labio | 1 | 0.4 | 0.4 | 3 | 1.1 | 0.8 |
| C01 | -Base de la lengua | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1.1 | 0.7 |
| C02 | -Otras partes de la lengua | 2 | 0.8 | 0.6 | 6 | 2.2 | 1.6 |
| C03 | -Encía | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C04 | -Piso de la boca | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.3 |
| C05 | -Paladar | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0.8 |
| C06 | -Otras de la boca | 3 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.3 |
| C07 | -Parótida | 2 | 0.8 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.7 |
| C08 | -Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C09 | -Amígdala | 1 | 0.4 | 0.4 | 8 | 2.9 | 2.2 |
| C10 | -Orofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C11 | -Nasofaringe | 1 | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.7 | 0.5 |
| C12 | -Seno periforme | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C13 | -Hipofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0.5 |
| C14 | -Otras cavidad bucal | 1 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0.6 |
| C15- C26 | Órganos digestivos | 78 | 29.6 | 19.3 | 108 | 39.8 | 28.7 |
| C15 | -Esófago | 5 | 1.9 | 1.6 | 25 | 9.2 | 6.8 |
| C16 | -Estomago | 6 | 2.3 | 1.3 | 17 | 6.3 | 4.2 |
| C17 | -Intestino delgado | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0.6 |
| C18 | -Colon | 32 | 12.1 | 7.6 | 31 | 11.4 | 8.5 |
| C19 | -Unión recto-sigmoidea | 1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C20 | -Recto | 10 | 3.8 | 3.3 | 8 | 2.9 | 2.3 |
| C21 | -Año y conducto anal | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C22 | -Hígado y conducto biliar | 8 | 3.0 | 1.9 | 12 | 4.4 | 3.3 |
| C23 | -Vesícula biliar | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1.1 | 0.9 |
| C24 | -Otras partes y las no especificadas de las vías biliares | 1 | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.7 | 0.4 |
| C25 | -Páncreas | 15 | 5.7 | 3.5 | 5 | 1.8 | 1.3 |
| C26 | -Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.2 |
| C30- C39 | Sistema respiratorio y órganos intratorácicos | 68 | 25.8 | 18.3 | 136 | 50.1 | 35.4 |
| C30 | -Cavidad nasal-oído medio | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C31 | -Senos paranasales | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C32 | -Laringe | 2 | 0.8 | 0.7 | 29 | 10.7 | 7.7 |
| C33 | -Tráquea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C34 | -Bronquios y pulmón | 63 | 23.9 | 16.7 | 104 | 38.3 | 27.1 |
| C37 | -Timo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C38 | -Corazón-mediastino-pleura | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C39 | -Otros sistema respiratorio | 3 | 1.1 | 1.0 | 2 | 0.7 | 0.4 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 38: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Las Tunas, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|------------------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C40-C41 | Huesos articulaciones y cartílago articular | 4 | 1.5 | 1.4 | 4 | 1.5 | 1.3 |
| C40 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.5 |
| C41 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados | 3 | 1.1 | 1.0 | 3 | 1.1 | 0.8 |
| 980-994 | Leucemias | 15 | 5.7 | 5.3 | 12 | 4.4 | 3.7 |
| 9800 | Leucemias sin especificar | 1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9801 | Agudas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9800 | Crónicas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9820 | Linfoblásticas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9821 | Linfoblásticas agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9823 | Linfoblásticas crónicas | 2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9860 | Mieloides sin especificar | 1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9861 | Mieloides agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9863 | Mieloides crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9940-9948 | Otras leucemias | 11 | 4.2 | 4.0 | 12 | 4.4 | 3.7 |
| 9732 | Mielomas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C44 | Piel | 69 | 26.2 | 17.6 | 63 | 23.2 | 16.0 |
| C47 | Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo | 2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C48 | Peritoneo-retroperitoneo | 2 | 0.8 | 0.5 | 6 | 2.2 | 1.7 |
| C49 | Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos | 1 | 0.4 | 0.3 | 3 | 1.1 | 0.6 |
| C50 | Mama | 111 | 42.1 | 30.2 | 2 | 0.7 | 0.5 |
| C51-C58 | Órganos genitales femeninos. | 128 | 48.6 | 34.3 | - | - | - |
| C51 | -Vulva | 2 | 0.8 | 0.7 | - | - | - |
| C52 | -Vagina | 2 | 0.8 | 0.6 | - | - | - |
| C53 | -Cuello uterino | 84 | 31.9 | 22.3 | - | - | - |
| C54 | -Cuerpo uterino | 23 | 8.7 | 6.1 | - | - | - |
| C55 | -Útero sin especificar | 2 | 0.8 | 0.4 | - | - | - |
| C56 | -Ovario | 15 | 5.7 | 4.5 | - | - | - |
| C57 | -Otros órganos genitales femeninos y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C58 | -Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C60-C63 | Órganos genitales masculinos | - | - | - | 96 | 35.4 | 22.4 |
| C60 | -Pene | - | - | - | 3 | 1.1 | 0.8 |
| C61 | -Glándula prostática | - | - | - | 91 | 33.5 | 21.0 |
| C62 | -Testículo | - | - | - | 2 | 0.7 | 0.8 |
| C63 | Órganos genitales masculinos y los no especificados | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 38: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Las Tunas, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C64- C68 | Tracto urinario | 7 | 2.7 | 2.1 | 29 | 10.7 | 7.3 |
| C64 | -Riñón | 3 | 1.1 | 1.4 | 4 | 1.5 | 1.7 |
| C65 | -Pelvis renal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C66 | -Uréter | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C67 | -Vejiga urinaria | 4 | 1.5 | 0.7 | 25 | 9.2 | 5.7 |
| C68 | -Otros órganos urinarios y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C69- C72 | Encéfalo, ojo, otros SNC | 14 | 5.3 | 3.6 | 15 | 5.5 | 4.5 |
| C69 | -Ojo y anexos | 1 | 0.4 | 0.2 | 3 | 1.1 | 1.0 |
| C70 | -Meninges | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C71 | -Encéfalo | 13 | 4.9 | 3.5 | 11 | 4.1 | 3.1 |
| C72 | -Medula espinal-nervios | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.6 |
| C73- C75 | Tiroides, y otras glándulas endocrinas | 13 | 4.9 | 4.1 | 7 | 2.6 | 2.1 |
| C73 | -Glándula tiroides | 13 | 4.9 | 4.1 | 7 | 2.6 | 2.1 |
| C74 | -Glándula suprarrenal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C75 | -Otras glándulas endocrinos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C76 | Sitios mal definidos | 4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.5 | 1.3 |
| 959-972 | Linfomas total | 16 | 6.1 | 4.7 | 22 | 8.1 | 6.8 |
| 965-966 | - Linfomas Hodgkin | 1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 967-972 | - Linfomas no Hodgkin | 8 | 3.0 | 2.6 | 17 | 6.3 | 5.5 |
| 959 | - Otros sin especificar | 7 | 2.7 | 1.7 | 5 | 1.8 | 1.4 |
| C80 | Sitio primario desconocido | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0.5 |
| C00- C80 | Todas las localizaciones | 543 | 206.1 | 145.2 | 541 | 199.3 | 140.4 |

*cifras preliminares

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 39: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Holguín, 2008*

| Masculino | | | | |
|-----------|--------------------------------|------|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C44 | Piel | 284 | 54.1 | 37.0 |
| C61 | Glándula prostática | 223 | 42.5 | 25.6 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 155 | 29.5 | 19.5 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 78 | 14.9 | 11.2 |
| C18 | Colon | 62 | 11.8 | 7.9 |
| C32 | Laringe | 54 | 10.3 | 7.9 |
| 980-994 | Leucemias | 43 | 8.2 | 6.7 |
| C15 | Esófago | 42 | 8.0 | 6.0 |
| C67 | Vejiga urinaria | 42 | 8.0 | 5.5 |
| 959-964 | Linfomas | 33 | 6.3 | 4.6 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 1244 | 237.1 | 161.8 |

| Femenino | | | | |
|----------|--------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C44 | Piel | 257 | 50.2 | 32.5 |
| C50 | Mama | 78 | 15.2 | 10.7 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 76 | 14.8 | 10.0 |
| C18 | Colon | 60 | 11.7 | 7.0 |
| C53 | Cuello uterino | 31 | 6.1 | 4.1 |
| C73 | Glándula tiroides | 30 | 5.9 | 4.3 |
| 959-964 | Linfomas | 26 | 5.1 | 3.7 |
| 980-994 | Leucemias | 26 | 5.1 | 3.4 |
| C56 | Ovario | 23 | 4.5 | 3.2 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 22 | 4.3 | 2.7 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 857 | 167.4 | 111.5 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 40: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Holguín, 2008*

| Masculino | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------|------|----------|--------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C44 | Piel | 100 | 28.9 | 184 | 232.5 |
| C61 | Glándula prostática | 14 | 4.0 | 209 | 264.1 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 23 | 6.6 | 132 | 166.8 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 34 | 9.8 | 44 | 55.6 |
| C18 | Colon | 14 | 4.0 | 48 | 60.6 |
| C32 | Laringe | 23 | 6.6 | 31 | 39.2 |
| C67 | Vejiga urinaria | 4 | 1.2 | 38 | 48.0 |
| C15 | Esófago | 12 | 3.5 | 30 | 37.9 |
| 980-994 | Leucemias | 16 | 4.6 | 22 | 27.8 |
| 959-964 | Linfomas | 17 | 4.9 | 15 | 19.0 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 336 | 97.1 | 898 | 1134.6 |

| Femenino | | | | | |
|----------|--------------------------|-------|------|----------|-------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C44 | Piel | 99 | 29.5 | 158 | 190.7 |
| C50 | Mama | 26 | 7.7 | 52 | 62.8 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 17 | 5.1 | 59 | 71.2 |
| C18 | Colon | 11 | 3.3 | 49 | 59.2 |
| C53 | Cuello uterino | 18 | 5.4 | 13 | 15.7 |
| C73 | Glándula tiroides | 24 | 7.1 | 6 | 7.2 |
| 959-964 | Linfomas | 15 | 4.5 | 11 | 13.3 |
| 980-994 | Leucemias | 7 | 2.1 | 18 | 21.7 |
| C56 | Ovario | 17 | 5.1 | 6 | 7.2 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 7 | 2.1 | 15 | 18.1 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 311 | 92.6 | 543 | 655.6 |

*cifras preliminares

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 41: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Holguín, 2008*

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C00- C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 13 | 2.5 | 1.9 | 78 | 14.9 | 11.2 |
| C00 | -Labio | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1.0 | 0.9 |
| C01 | -Base de la lengua | 1 | 0.2 | 0.2 | 10 | 1.9 | 1.4 |
| C02 | -Otras partes de la lengua | 1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1.0 | 0.8 |
| C03 | -Encía | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| C04 | -Piso de la boca | 0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1.7 | 1.5 |
| C05 | -Paladar | 1 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.6 |
| C06 | -Otras de la boca | 4 | 0.8 | 0.6 | 7 | 1.3 | 0.9 |
| C07 | -Parótida | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
| C08 | -Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C09 | -Amígdala | 1 | 0.2 | 0.2 | 18 | 3.4 | 2.9 |
| C10 | -Orofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0.8 | 0.7 |
| C11 | -Nasofaringe | 3 | 0.6 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.5 |
| C12 | -Seno periforme | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| C13 | -Hipofaringe | 1 | 0.2 | 0.1 | 11 | 2.1 | 1.5 |
| C14 | -Otras cavidad bucal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C15- C26 | Órganos digestivos | 164 | 32.0 | 20.4 | 210 | 40.0 | 27.0 |
| C15 | -Esófago | 11 | 2.1 | 1.4 | 42 | 8.0 | 6.0 |
| C16 | -Estomago | 14 | 2.7 | 1.8 | 28 | 5.3 | 3.5 |
| C17 | -Intestino delgado | 2 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 |
| C18 | -Colon | 60 | 11.7 | 7.0 | 62 | 11.8 | 7.9 |
| C19 | -Unión recto-sigmoidea | 2 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| C20 | -Recto | 15 | 2.9 | 2.3 | 21 | 4.0 | 2.4 |
| C21 | -Año y conducto anal | 10 | 2.0 | 1.5 | 6 | 1.1 | 1.0 |
| C22 | -Hígado y conducto biliar | 22 | 4.3 | 2.7 | 21 | 4.0 | 2.9 |
| C23 | -Vesícula biliar | 3 | 0.6 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.3 |
| C24 | -Otras partes y las no especificadas de las vías biliares | 5 | 1.0 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0.5 |
| C25 | -Páncreas | 19 | 3.7 | 2.3 | 21 | 4.0 | 2.5 |
| C26 | -Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| C30- C39 | Sistema respiratorio y órganos intratorácicos | 90 | 17.6 | 11.8 | 221 | 42.1 | 29.1 |
| C30 | -Cavidad nasal-oído medio | 1 | 0.2 | 0.1 | 4 | 0.8 | 0.7 |
| C31 | -Senos paranasales | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| C32 | -Laringe | 10 | 2.0 | 1.4 | 54 | 10.3 | 7.9 |
| C33 | -Tráquea | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| C34 | -Bronquios y pulmón | 76 | 14.8 | 10.0 | 155 | 29.5 | 19.5 |
| C37 | -Timo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C38 | -Corazón-mediastino-pleura | 1 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.4 |
| C39 | -Otros sistema respiratorio | 2 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0.8 | 0.7 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 41: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Holguín, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|------------------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C40-C41 | Huesos articulaciones y cartílago articular | 10 | 2.0 | 1.4 | 8 | 1.5 | 1.3 |
| C40 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros | 2 | 0.4 | 0.2 | 5 | 1.0 | 0.9 |
| C41 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados | 8 | 1.6 | 1.3 | 3 | 0.6 | 0.5 |
| 980-994 | Leucemias | 26 | 5.1 | 3.4 | 43 | 8.2 | 6.7 |
| 9800 | Leucemias sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9801 | Agudas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9800 | Crónicas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9820 | Linfoblásticas sin especificar | 1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1.0 | 1.3 |
| 9821 | Linfoblásticas agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9823 | Linfoblásticas crónicas | 5 | 1.0 | 0.8 | 8 | 1.5 | 1.2 |
| 9860 | Mieloides sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9861 | Mieloides agudas | 3 | 0.6 | 0.5 | 5 | 1.0 | 1.1 |
| 9863 | Mieloides crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9940-9948 | Otras leucemias | 17 | 3.3 | 2.1 | 25 | 4.8 | 3.2 |
| 9732 | Mielomas | 5 | 1.0 | 0.8 | 3 | 0.6 | 0.5 |
| C44 | Piel | 257 | 50.2 | 32.5 | 284 | 54.1 | 37.0 |
| C47 | Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C48 | Peritoneo-retroperitoneo | 9 | 1.8 | 1.4 | 5 | 1.0 | 0.9 |
| C49 | Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos | 2 | 0.4 | 0.4 | 10 | 1.9 | 1.5 |
| C50 | Mama | 78 | 15.2 | 10.7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C51-C58 | Órganos genitales femeninos. | 88 | 17.2 | 11.5 | - | - | - |
| C51 | -Vulva | 7 | 1.4 | 1.0 | - | - | - |
| C52 | -Vagina | 2 | 0.4 | 0.3 | - | - | - |
| C53 | -Cuello uterino | 31 | 6.1 | 4.1 | - | - | - |
| C54 | -Cuerpo uterino | 18 | 3.5 | 2.4 | - | - | - |
| C55 | -Útero sin especificar | 7 | 1.4 | 0.9 | - | - | - |
| C56 | -Ovario | 23 | 4.5 | 3.2 | - | - | - |
| C57 | -Otros órganos genitales femeninos y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C58 | -Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C60-C63 | Órganos genitales masculinos | - | - | - | 238 | 45.4 | 27.9 |
| C60 | -Pene | - | - | - | 11 | 2.1 | 1.5 |
| C61 | -Glándula prostática | - | - | - | 223 | 42.5 | 25.6 |
| C62 | -Testículo | - | - | - | 4 | 0.8 | 0.9 |
| C63 | Órganos genitales masculinos y los no especificados | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 41: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Holguín, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|----------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C64-C68 | Tracto urinario | 25 | 4.9 | 3.1 | 56 | 10.7 | 7.7 |
| C64 | -Riñón | 4 | 0.8 | 0.5 | 11 | 2.1 | 1.9 |
| C65 | -Pelvis renal | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C66 | -Uréter | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.6 | 0.4 |
| C67 | -Vejiga urinaria | 20 | 3.9 | 2.5 | 42 | 8.0 | 5.5 |
| C68 | -Otros órganos urinarios y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C69-C72 | Encéfalo, ojo, otros SNC | 22 | 4.3 | 3.2 | 27 | 5.1 | 3.2 |
| C69 | -Ojo y anexos | 2 | 0.4 | 0.3 | 8 | 1.5 | 1.1 |
| C70 | -Meninges | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C71 | -Encéfalo | 20 | 3.9 | 3.0 | 18 | 3.4 | 2.0 |
| C72 | -Medula espinal-nervios | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| C73-C75 | Tiroides, y otras glándulas endocrinas | 31 | 6.1 | 4.5 | 7 | 1.3 | 1.1 |
| C73 | -Glándula tiroides | 30 | 5.9 | 4.3 | 6 | 1.1 | 1.0 |
| C74 | -Glándula suprarrenal | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
| C75 | -Otras glándulas endocrinas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C76 | Sitios mal definidos | 6 | 1.2 | 0.8 | 7 | 1.3 | 1.0 |
| 959-972 | Linfomas total | 26 | 5.1 | 3.7 | 33 | 6.3 | 4.6 |
| 965-966 | - Linfomas Hodgkin | 5 | 1.0 | 0.9 | 6 | 1.1 | 1.0 |
| 967-972 | - Linfomas no Hodgkin | 12 | 2.3 | 1.6 | 12 | 2.3 | 1.8 |
| 959 | - Otros sin especificar | 9 | 1.8 | 1.3 | 15 | 2.9 | 2.0 |
| C80 | Sitio primario desconocido | 4 | 0.8 | 0.7 | 14 | 2.7 | 1.8 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 857 | 167.4 | 111.5 | 1244 | 237.1 | 161.8 |

*cifras preliminares

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 42: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Granma, 2008*

| Masculino | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C61 | Glándula prostática | 174 | 41.0 | 25.2 |
| C44 | Piel | 152 | 35.8 | 27.3 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 124 | 29.2 | 20.7 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 55 | 12.9 | 9.7 |
| C15 | Esófago | 38 | 8.9 | 7.0 |
| 980-994 | Leucemias | 32 | 7.5 | 6.2 |
| C32 | Laringe | 31 | 7.3 | 6.0 |
| C18 | Colon | 29 | 6.8 | 5.0 |
| C67 | Vejiga urinaria | 25 | 5.9 | 4.1 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 23 | 5.4 | 4.1 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 857 | 201.7 | 147.8 |

| Femenino | | | | |
|----------|--------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C50 | Mama | 205 | 49.8 | 36.2 |
| C44 | Piel | 151 | 36.7 | 26.0 |
| C53 | Cuello uterino | 95 | 23.1 | 16.6 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 56 | 13.6 | 9.9 |
| C18 | Colon | 51 | 12.4 | 7.9 |
| C54 | Cuerpo uterino | 37 | 9.0 | 7.0 |
| C56 | Ovario | 33 | 8.0 | 5.7 |
| C73 | Glándula tiroides | 26 | 6.3 | 4.9 |
| C16 | Estomago | 25 | 6.1 | 3.9 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 18 | 4.4 | 2.8 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 866 | 210.3 | 151.8 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 43: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Granma, 2008*

| Masculino | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------|------|----------|--------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C61 | Glándula prostática | 14 | 5.0 | 160 | 261.2 |
| C44 | Piel | 58 | 20.7 | 93 | 151.8 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 20 | 7.1 | 104 | 169.8 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 25 | 8.9 | 30 | 49.0 |
| C15 | Esófago | 14 | 5.0 | 24 | 39.2 |
| C32 | Laringe | 12 | 4.3 | 19 | 31.0 |
| C18 | Colon | 9 | 3.2 | 20 | 32.7 |
| 980-994 | Leucemias | 10 | 3.6 | 19 | 31.0 |
| C67 | Vejiga urinaria | 1 | 0.4 | 24 | 39.2 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 4 | 1.4 | 18 | 29.4 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 226 | 80.8 | 616 | 1005.6 |

| Femenino | | | | | |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------|-------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C50 | Mama | 102 | 37.6 | 103 | 167.7 |
| C44 | Piel | 65 | 24.0 | 85 | 138.4 |
| C53 | Cuello uterino | 68 | 25.1 | 27 | 44.0 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 16 | 5.9 | 40 | 65.1 |
| C18 | Colon | 10 | 3.7 | 41 | 66.7 |
| C54 | Cuerpo uterino | 13 | 4.8 | 24 | 39.1 |
| C56 | Ovario | 23 | 8.5 | 10 | 16.3 |
| C73 | Glándula tiroides | 22 | 8.1 | 4 | 6.5 |
| C16 | Estomago | 8 | 3.0 | 17 | 27.7 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 1 | 0.4 | 17 | 27.7 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 391 | 144.3 | 469 | 763.5 |

*cifras preliminares

tasa: tasa especifica por edad por 100 000 habitantes habitantes

Tabla 44: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Granma, 2008*

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C00- C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 16 | 3.9 | 2.7 | 55 | 12.9 | 9.7 |
| C00 | -Labio | 3 | 0.7 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0.6 |
| C01 | -Base de la lengua | 1 | 0.2 | 0.2 | 6 | 1.4 | 1.3 |
| C02 | -Otras partes de la lengua | 4 | 1.0 | 0.7 | 7 | 1.6 | 1.0 |
| C03 | -Encía | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C04 | -Piso de la boca | 2 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.5 | 0.4 |
| C05 | -Paladar | 2 | 0.5 | 0.3 | 4 | 0.9 | 0.9 |
| C06 | -Otras de la boca | 1 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.7 | 0.5 |
| C07 | -Parótida | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C08 | -Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C09 | -Amígdala | 1 | 0.2 | 0.2 | 10 | 2.4 | 2.0 |
| C10 | -Orofaringe | 1 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0.9 | 0.8 |
| C11 | -Nasofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0.3 |
| C12 | -Seno periforme | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0.3 |
| C13 | -Hipofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1.4 | 1.0 |
| C14 | -Otras cavidad bucal | 0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 1.9 | 1.4 |
| C15- C26 | Órganos digestivos | 141 | 34.2 | 22.5 | 147 | 34.6 | 26.0 |
| C15 | -Esófago | 7 | 1.7 | 1.0 | 38 | 8.9 | 7.0 |
| C16 | -Estomago | 25 | 6.1 | 3.9 | 22 | 5.2 | 4.1 |
| C17 | -Intestino delgado | 3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C18 | -Colon | 51 | 12.4 | 7.9 | 29 | 6.8 | 5.0 |
| C19 | -Unión recto-sigmoidea | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C20 | -Recto | 14 | 3.4 | 2.7 | 16 | 3.8 | 2.8 |
| C21 | -Año y conducto anal | 5 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C22 | -Hígado y conducto biliar | 18 | 4.4 | 2.8 | 23 | 5.4 | 4.1 |
| C23 | -Vesícula biliar | 2 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| C24 | -Otras partes y las no especificadas de las vías biliares | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.4 |
| C25 | -Páncreas | 12 | 2.9 | 2.1 | 15 | 3.5 | 2.7 |
| C26 | -Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos | 3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C30- C39 | Sistema respiratorio y órganos intratorácicos | 65 | 15.8 | 11.5 | 161 | 37.9 | 27.7 |
| C30 | -Cavidad nasal-oído medio | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0.3 |
| C31 | -Senos paranasales | 1 | 0.2 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.4 |
| C32 | -Laringe | 6 | 1.5 | 1.2 | 31 | 7.3 | 6.0 |
| C33 | -Tráquea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C34 | -Bronquios y pulmón | 56 | 13.6 | 9.9 | 124 | 29.2 | 20.7 |
| C37 | -Timo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C38 | -Corazón-mediastino-pleura | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.3 |
| C39 | -Otros sistema respiratorio | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.5 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 44: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Granma, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|------------------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C40-C41 | Huesos articulaciones y cartílago articular | 6 | 1.5 | 1.3 | 6 | 1.4 | 1.4 |
| C40 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.7 | 0.9 |
| C41 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados | 4 | 1.0 | 0.8 | 3 | 0.7 | 0.6 |
| 980-994 | Leucemias | 15 | 3.6 | 3.3 | 32 | 7.5 | 6.2 |
| 9800 | Leucemias sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9801 | Agudas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9800 | Crónicas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9820 | Linfoblásticas sin especificar | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.6 |
| 9821 | Linfoblásticas agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9823 | Linfoblásticas crónicas | 1 | 0.2 | 0.3 | 6 | 1.4 | 1.1 |
| 9860 | Mieloides sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 9861 | Mieloides agudas | 3 | 0.7 | 0.8 | 3 | 0.7 | 0.7 |
| 9863 | Mieloides crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9940-9948 | Otras leucemias | 10 | 2.4 | 2.2 | 19 | 4.5 | 3.5 |
| 9732 | Mielomas | 7 | 1.7 | 1.3 | 8 | 1.9 | 1.4 |
| C44 | Piel | 151 | 36.7 | 26.0 | 152 | 35.8 | 27.3 |
| C47 | Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0.4 |
| C48 | Peritoneo-retroperitoneo | 3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.5 |
| C49 | Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.3 |
| C50 | Mama | 205 | 49.8 | 36.2 | 2 | 0.5 | 0.4 |
| C51-C58 | Órganos genitales femeninos. | 179 | 43.5 | 31.8 | - | - | - |
| C51 | -Vulva | 5 | 1.2 | 1.0 | - | - | - |
| C52 | -Vagina | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C53 | -Cuello uterino | 95 | 23.1 | 16.6 | - | - | - |
| C54 | -Cuerpo uterino | 37 | 9.0 | 7.0 | - | - | - |
| C55 | -Útero sin especificar | 7 | 1.7 | 1.5 | - | - | - |
| C56 | -Ovario | 33 | 8.0 | 5.7 | - | - | - |
| C57 | -Otros órganos genitales femeninos y los no especificados | 2 | 0.5 | 0.3 | - | - | - |
| C58 | -Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C60-C63 | Órganos genitales masculinos | - | - | - | 182 | 42.8 | 26.8 |
| C60 | -Pene | - | - | - | 8 | 1.9 | 1.7 |
| C61 | -Glándula prostática | - | - | - | 174 | 41.0 | 25.2 |
| C62 | -Testículo | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C63 | Órganos genitales masculinos y los no especificados | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 44: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Granma, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|----------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C64-C68 | Tracto urinario | 13 | 3.2 | 2.5 | 40 | 9.4 | 7.2 |
| C64 | -Riñón | 5 | 1.2 | 1.3 | 15 | 3.5 | 3.2 |
| C65 | -Pelvis renal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C66 | -Uréter | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C67 | -Vejiga urinaria | 7 | 1.7 | 1.1 | 25 | 5.9 | 4.1 |
| C68 | -Otros órganos urinarios y los no especificados | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C69-C72 | Encéfalo, ojo, otros SNC | 13 | 3.2 | 2.8 | 21 | 4.9 | 4.0 |
| C69 | -Ojo y anexos | 3 | 0.7 | 0.7 | 4 | 0.9 | 0.7 |
| C70 | -Meninges | 3 | 0.7 | 0.5 | 7 | 1.6 | 1.5 |
| C71 | -Encéfalo | 6 | 1.5 | 1.6 | 10 | 2.4 | 2.0 |
| C72 | -Medula espinal-nervios | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C73-C75 | Tiroides, y otras glándulas endocrinas | 26 | 6.3 | 4.9 | 9 | 2.1 | 1.5 |
| C73 | -Glándula tiroides | 26 | 6.3 | 4.9 | 9 | 2.1 | 1.5 |
| C74 | -Glándula suprarrenal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C75 | -Otras glándulas endocrinas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C76 | Sitios mal definidos | 3 | 0.7 | 0.7 | 4 | 0.9 | 0.7 |
| 959-972 | Linfomas total | 11 | 2.7 | 2.4 | 20 | 4.7 | 4.4 |
| 965-966 | - Linfomas Hodgkin | 4 | 1.0 | 1.0 | 5 | 1.2 | 1.0 |
| 967-972 | - Linfomas no Hodgkin | 3 | 0.7 | 0.8 | 11 | 2.6 | 2.7 |
| 959 | - Otros sin especificar | 4 | 1.0 | 0.6 | 4 | 0.9 | 0.9 |
| C80 | Sitio primario desconocido | 10 | 2.4 | 1.8 | 14 | 3.3 | 2.8 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 866 | 210.3 | 151.8 | 857 | 201.7 | 147.8 |

*cifras preliminares

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 45: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Santiago de Cuba, 2008*

| Masculino | | | | |
|-----------|--------------------------------|------|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C61 | Glándula prostática | 383 | 73.1 | 52.4 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 227 | 43.3 | 32.2 |
| C44 | Piel | 151 | 28.8 | 21.6 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 65 | 12.4 | 9.2 |
| C18 | Colon | 62 | 11.8 | 8.8 |
| C15 | Esófago | 52 | 9.9 | 8.0 |
| 980-994 | Leucemias | 50 | 9.5 | 8.0 |
| C16 | Estomago | 49 | 9.4 | 6.7 |
| C32 | Laringe | 47 | 9.0 | 7.1 |
| C67 | Vejiga urinaria | 38 | 7.3 | 5.4 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 1389 | 265.2 | 198.6 |

| Femenino | | | | |
|----------|----------------------------|------|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C50 | Mama | 320 | 61.0 | 44.2 |
| C53 | Cuello uterino | 157 | 29.9 | 21.4 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 109 | 20.8 | 14.1 |
| C44 | Piel | 94 | 17.9 | 12.2 |
| C18 | Colon | 73 | 13.9 | 8.7 |
| C54 | Cuerpo uterino | 63 | 12.0 | 8.5 |
| C98 | Tiroides, otras endocrinas | 55 | 10.5 | 7.9 |
| C73 | Glándula tiroides | 52 | 9.9 | 7.7 |
| C56 | Ovario | 42 | 8.0 | 5.1 |
| 980-994 | Leucemias | 39 | 7.4 | 6.4 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 1249 | 238.1 | 169.4 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 46: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Santiago de Cuba, 2008*

| Masculino | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------|------|----------|--------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C61 | Glándula prostática | 22 | 6.3 | 361 | 490.9 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 63 | 18.1 | 164 | 223.0 |
| C44 | Piel | 46 | 13.2 | 105 | 142.8 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 26 | 7.5 | 39 | 53.0 |
| C18 | Colon | 14 | 4.0 | 48 | 65.3 |
| C15 | Esófago | 23 | 6.6 | 29 | 39.4 |
| C16 | Estomago | 13 | 3.7 | 36 | 49.0 |
| C32 | Laringe | 13 | 3.7 | 34 | 46.2 |
| 980-994 | Leucemias | 17 | 4.9 | 29 | 39.4 |
| C67 | Vejiga urinaria | 6 | 1.7 | 32 | 43.5 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 347 | 99.7 | 1030 | 1400.6 |

| Femenino | | | | | |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------|-------|
| | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C50 | Mama | 163 | 46.9 | 157 | 195.6 |
| C53 | Cuello uterino | 106 | 30.5 | 51 | 63.5 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 31 | 8.9 | 78 | 97.2 |
| C44 | Piel | 34 | 9.8 | 60 | 74.7 |
| C15 | Colon | 13 | 3.7 | 60 | 74.7 |
| C54 | Cuerpo uterino | 25 | 7.2 | 38 | 47.3 |
| C73 | Glándula tiroides | 41 | 11.8 | 11 | 13.7 |
| C56 | Ovario | 33 | 9.5 | 8 | 10.0 |
| 980-994 | Leucemias | 13 | 3.7 | 20 | 24.9 |
| C25 | Páncreas | 6 | 1.7 | 21 | 26.2 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 568 | 163.5 | 665 | 828.4 |

*cifras preliminares

tasa: tasa especifica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 47: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Santiago de Cuba, 2008*

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C00- C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 20 | 3.8 | 3.1 | 65 | 12.4 | 9.2 |
| C00 | -Labio | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.4 |
| C01 | -Base de la lengua | 3 | 0.6 | 0.5 | 11 | 2.1 | 1.6 |
| C02 | -Otras partes de la lengua | 3 | 0.6 | 0.6 | 7 | 1.3 | 1.1 |
| C03 | -Encía | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C04 | -Piso de la boca | 2 | 0.4 | 0.4 | 6 | 1.1 | 1.0 |
| C05 | -Paladar | 2 | 0.4 | 0.4 | 5 | 1.0 | 0.8 |
| C06 | -Otras de la boca | 3 | 0.6 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.2 |
| C07 | -Parótida | 2 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| C08 | -Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| C09 | -Amígdala | 1 | 0.2 | 0.2 | 11 | 2.1 | 1.6 |
| C10 | -Orofaringe | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.2 |
| C11 | -Nasofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 1.5 | 1.1 |
| C12 | -Seno periforme | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 0.3 |
| C13 | -Hipofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1.1 | 0.9 |
| C14 | -Otras cavidad bucal | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| C15- C26 | Órganos digestivos | 193 | 36.8 | 24.1 | 259 | 49.4 | 36.8 |
| C15 | -Esófago | 14 | 2.7 | 2.2 | 52 | 9.9 | 8.0 |
| C16 | -Estomago | 17 | 3.2 | 2.2 | 49 | 9.4 | 6.7 |
| C17 | -Intestino delgado | 3 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.6 | 0.6 |
| C18 | -Colon | 73 | 13.9 | 8.7 | 62 | 11.8 | 8.8 |
| C19 | -Unión recto-sigmoidea | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C20 | -Recto | 26 | 5.0 | 3.3 | 25 | 4.8 | 3.3 |
| C21 | -Año y conducto anal | 5 | 1.0 | 0.8 | 2 | 0.4 | 0.3 |
| C22 | -Hígado y conducto biliar | 21 | 4.0 | 2.6 | 29 | 5.5 | 4.4 |
| C23 | -Vesícula biliar | 4 | 0.8 | 0.6 | 5 | 1.0 | 0.7 |
| C24 | -Otras partes y las no especificadas de las vías biliares | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.4 |
| C25 | -Páncreas | 27 | 5.1 | 3.5 | 30 | 5.7 | 4.1 |
| C26 | -Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C30- C39 | Sistema respiratorio y órganos intratorácicos | 130 | 24.8 | 17.3 | 293 | 55.9 | 41.9 |
| C30 | -Cavidad nasal-oído medio | 1 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.5 |
| C31 | -Senos paranasales | 1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1.0 | 0.9 |
| C32 | -Laringe | 12 | 2.3 | 1.7 | 47 | 9.0 | 7.1 |
| C33 | -Tráquea | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C34 | -Bronquios y pulmón | 109 | 20.8 | 14.1 | 227 | 43.3 | 32.2 |
| C37 | -Timo | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0.8 | 0.5 |
| C38 | -Corazón-mediastino-pleura | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.3 |
| C39 | -Otros sistema respiratorio | 4 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1.0 | 0.9 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 47: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Santiago de Cuba, 2008* (continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|------------------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C40-C41 | Huesos articulaciones y cartílago articular | 5 | 1.0 | 0.7 | 5 | 1.0 | 1.0 |
| C40 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.6 | 0.7 |
| C41 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados | 5 | 1.0 | 0.7 | 2 | 0.4 | 0.4 |
| 980-994 | Leucemias | 39 | 7.4 | 6.4 | 50 | 9.5 | 8.0 |
| 9800 | Leucemias sin especificar | 2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9801 | Agudas sin especificar | 3 | 0.6 | 0.5 | 3 | 0.6 | 0.6 |
| 9800 | Crónicas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9820 | Linfoblásticas sin especificar | 10 | 1.9 | 2.3 | 16 | 3.1 | 2.9 |
| 9821 | Linfoblásticas agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9823 | Linfoblásticas crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9860 | Mieloides sin especificar | 8 | 1.5 | 1.0 | 8 | 1.5 | 1.4 |
| 9861 | Mieloides agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9863 | Mieloides crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9940-9948 | Otras leucemias | 16 | 3.1 | 2.5 | 23 | 4.4 | 3.2 |
| 9732 | Mielomas | 3 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.6 | 0.5 |
| C44 | Piel | 94 | 17.9 | 12.2 | 151 | 28.8 | 21.6 |
| C47 | Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| C48 | Peritoneo-retroperitoneo | 5 | 1.0 | 0.8 | 2 | 0.4 | 0.4 |
| C49 | Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos | 4 | 0.8 | 0.5 | 6 | 1.1 | 0.8 |
| C50 | Mama | 320 | 61.0 | 44.2 | 5 | 1.0 | 0.9 |
| C51-C58 | Órganos genitales femeninos. | 270 | 51.5 | 35.8 | - | - | - |
| C51 | -Vulva | 2 | 0.4 | 0.3 | - | - | - |
| C52 | -Vagina | 3 | 0.6 | 0.4 | - | - | - |
| C53 | -Cuello uterino | 157 | 29.9 | 21.4 | - | - | - |
| C54 | -Cuerpo uterino | 63 | 12.0 | 8.5 | - | - | - |
| C55 | -Útero sin especificar | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
| C56 | -Ovario | 42 | 8.0 | 5.1 | - | - | - |
| C57 | -Otros órganos genitales femeninos y los no especificados | 2 | 0.4 | 0.3 | - | - | - |
| C58 | -Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C60-C63 | Órganos genitales masculinos | - | - | - | 396 | 75.6 | 54.7 |
| C60 | -Pene | - | - | - | 10 | 1.9 | 1.7 |
| C61 | -Glándula prostática | - | - | - | 383 | 73.1 | 52.4 |
| C62 | -Testículo | - | - | - | 2 | 0.4 | 0.3 |
| C63 | Órganos genitales masculinos y los no especificados | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.4 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 47: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Santiago de Cuba, 2008* (continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|----------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C64-C68 | Tracto urinario | 29 | 5.5 | 3.4 | 63 | 12.0 | 9.3 |
| C64 | -Riñón | 13 | 2.5 | 1.6 | 24 | 4.6 | 3.9 |
| C65 | -Pelvis renal | 2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C66 | -Uréter | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C67 | -Vejiga urinaria | 12 | 2.3 | 1.4 | 38 | 7.3 | 5.4 |
| C68 | -Otros órganos urinarios y los no especificados | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| C69-C72 | Encéfalo, ojo, otros SNC | 31 | 5.9 | 5.9 | 30 | 5.7 | 4.8 |
| C69 | -Ojo y anexos | 4 | 0.8 | 1.0 | 4 | 0.8 | 0.9 |
| C70 | -Meninges | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C71 | -Encéfalo | 24 | 4.6 | 4.4 | 25 | 4.8 | 3.6 |
| C72 | -Medula espinal-nervios | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.4 |
| C73-C75 | Tiroides, y otras glándulas endocrinas | 55 | 10.5 | 7.9 | 13 | 2.5 | 2.4 |
| C73 | -Glándula tiroides | 52 | 9.9 | 7.7 | 11 | 2.1 | 1.7 |
| C74 | -Glándula suprarrenal | 3 | 0.6 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0.8 |
| C75 | -Otras glándulas endocrinas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C76 | Sitios mal definidos | 12 | 2.3 | 1.8 | 13 | 2.5 | 1.9 |
| 959-972 | Linfomas total | 20 | 3.8 | 3.4 | 23 | 4.4 | 3.5 |
| 965-966 | - Linfomas Hodgkin | 9 | 1.7 | 1.8 | 7 | 1.3 | 1.1 |
| 967-972 | - Linfomas no Hodgkin | 7 | 1.3 | 1.0 | 7 | 1.3 | 1.1 |
| 959 | - Otros sin especificar | 4 | 0.8 | 0.7 | 9 | 1.7 | 1.4 |
| C80 | Sitio primario desconocido | 19 | 3.6 | 2.2 | 11 | 2.1 | 1.6 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 1249 | 238.1 | 169.4 | 1389 | 265.2 | 198.6 |

*cifras preliminares

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 48: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Guantánamo, 2008*

| Masculino | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C61 | Glándula prostática | 123 | 47.7 | 33.9 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 68 | 26.4 | 20.5 |
| C44 | Piel | 33 | 12.8 | 10.4 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 24 | 9.3 | 7.5 |
| C32 | Laringe | 22 | 8.5 | 7.7 |
| C16 | Estomago | 22 | 8.5 | 7.1 |
| 980-994 | Leucemias | 17 | 6.6 | 6.1 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 16 | 6.2 | 5.0 |
| C18 | Colon | 13 | 5.0 | 3.9 |
| C25 | Páncreas | 11 | 4.3 | 3.7 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 434 | 168.5 | 132.0 |

| Femenino | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C50 | Mama | 90 | 35.2 | 28.0 |
| C53 | Cuello uterino | 85 | 33.2 | 26.5 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 44 | 17.2 | 12.8 |
| C44 | Piel | 33 | 12.9 | 9.9 |
| C18 | Colon | 19 | 7.4 | 5.4 |
| C16 | Estomago | 18 | 7.0 | 5.8 |
| C56 | Ovario | 18 | 7.0 | 5.8 |
| C90 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 13 | 5.1 | 3.5 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 13 | 5.1 | 3.4 |
| C73 | Glándula tiroides | 11 | 4.3 | 3.5 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 463 | 180.9 | 141.8 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 48: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Guantánamo, 2008*

| Masculino | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------|------|----------|-------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C61 | Glándula prostática | 7 | 4.2 | 116 | 343.4 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 14 | 8.4 | 54 | 159.8 |
| C44 | Piel | 9 | 5.4 | 24 | 71.0 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 11 | 6.6 | 13 | 38.5 |
| C16 | Estomago | 5 | 3.0 | 17 | 50.3 |
| C32 | Laringe | 6 | 3.6 | 16 | 47.4 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 6 | 3.6 | 10 | 29.6 |
| 980-994 | Leucemias | 6 | 3.6 | 8 | 23.7 |
| C18 | Colon | 2 | 1.2 | 11 | 32.6 |
| 959-994 | Linfomas | 6 | 3.6 | 5 | 14.8 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 101 | 60.5 | 326 | 965.0 |

| Femenino | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------|-------|----------|-------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C50 | Mama | 43 | 25.7 | 47 | 133.8 |
| C53 | Cuello uterino | 57 | 34.1 | 28 | 79.7 |
| C34 | Bronquios y pulmón | 10 | 6.0 | 34 | 96.8 |
| C44 | Piel | 10 | 6.0 | 23 | 65.5 |
| C18 | Colon | 4 | 2.4 | 15 | 42.7 |
| C16 | Estomago | 5 | 3.0 | 13 | 37.0 |
| C56 | Ovario | 13 | 7.8 | 5 | 14.2 |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 2 | 1.2 | 11 | 31.3 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 4 | 2.4 | 9 | 25.6 |
| C54 | Cuerpo uterino | 5 | 3.0 | 6 | 17.1 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 199 | 118.9 | 256 | 728.8 |

*cifras preliminares

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes habitantes

Tabla 49: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Guantánamo, 2008*

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|----------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C00-C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 13 | 5.1 | 3.5 | 24 | 9.3 | 7.5 |
| C00 | -Labio | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C01 | -Base de la lengua | 1 | 0.4 | 0.3 | 7 | 2.7 | 2.3 |
| C02 | -Otras partes de la lengua | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 0.8 |
| C03 | -Encía | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C04 | -Piso de la boca | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C05 | -Paladar | 3 | 1.2 | 0.9 | 2 | 0.8 | 0.5 |
| C06 | -Otras de la boca | 2 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C07 | -Parótida | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C08 | -Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C09 | -Amígdala | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 0.6 |
| C10 | -Orofaringe | 1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C11 | -Nasofaringe | 2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C12 | -Seno periforme | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C13 | -Hipofaringe | 1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C14 | -Otras cavidad bucal | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1.9 | 1.5 |
| C15-C26 | Órganos digestivos | 81 | 31.6 | 23.6 | 83 | 32.2 | 25.5 |
| C15 | -Esófago | 5 | 2.0 | 1.3 | 11 | 4.3 | 3.0 |
| C16 | -Estomago | 18 | 7.0 | 5.8 | 22 | 8.5 | 7.1 |
| C17 | -Intestino delgado | 2 | 0.8 | 0.7 | 3 | 1.2 | 1.0 |
| C18 | -Colon | 19 | 7.4 | 5.4 | 13 | 5.0 | 3.9 |
| C19 | -Unión recto-sigmoidea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C20 | -Recto | 7 | 2.7 | 2.3 | 4 | 1.6 | 1.4 |
| C21 | -Año y conducto anal | 3 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C22 | -Hígado y conducto biliar | 13 | 5.1 | 3.4 | 16 | 6.2 | 5.0 |
| C23 | -Vesícula biliar | 4 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.3 |
| C24 | -Otras partes y las no especificadas de las vías biliares | 1 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.8 | 0.6 |
| C25 | -Páncreas | 8 | 3.1 | 2.3 | 11 | 4.3 | 3.7 |
| C26 | -Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C30-C39 | Sistema respiratorio y órganos intratorácicos | 53 | 20.7 | 15.2 | 94 | 36.5 | 29.4 |
| C30 | -Cavidad nasal-oído medio | 3 | 1.2 | 0.9 | 2 | 0.8 | 0.7 |
| C31 | -Senos paranasales | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.3 |
| C32 | -Laringe | 5 | 2.0 | 1.3 | 22 | 8.5 | 7.7 |
| C33 | -Tráquea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C34 | -Bronquios y pulmón | 44 | 17.2 | 12.8 | 68 | 26.4 | 20.5 |
| C37 | -Timo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C38 | -Corazón-mediastino-pleura | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.5 |
| C39 | -Otros sistema respiratorio | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 49: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Guantánamo, 2008*
(continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|------------------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C40-C41 | Huesos articulaciones y cartílago articular | 2 | 0.8 | 0.7 | 3 | 1.2 | 1.3 |
| C40 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.5 |
| C41 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados | 2 | 0.8 | 0.7 | 2 | 0.8 | 0.8 |
| 980-994 | Leucemias | 10 | 3.9 | 4.1 | 17 | 6.6 | 6.1 |
| 9800 | Leucemias sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9801 | Agudas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.7 |
| 9800 | Crónicas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9820 | Linfoblásticas sin especificar | 5 | 2.0 | 2.9 | 2 | 0.8 | 0.9 |
| 9821 | Linfoblásticas agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9823 | Linfoblásticas crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9860 | Mieloides sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.3 |
| 9861 | Mieloides agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.7 |
| 9863 | Mieloides crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9940-9948 | Otras leucemias | 5 | 2.0 | 1.3 | 12 | 4.7 | 3.6 |
| 9732 | Mielomas | 3 | 1.2 | 0.9 | 3 | 1.2 | 0.6 |
| C44 | Piel | 33 | 12.9 | 9.9 | 33 | 12.8 | 10.4 |
| C47 | Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C48 | Peritoneo-retroperitoneo | 2 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.3 |
| C49 | Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| C50 | Mama | 90 | 35.2 | 28.0 | 3 | 1.2 | 1.1 |
| C51-C58 | Órganos genitales femeninos. | 130 | 50.8 | 40.6 | - | - | - |
| C51 | -Vulva | 7 | 2.7 | 2.3 | - | - | - |
| C52 | -Vagina | 2 | 0.8 | 0.7 | - | - | - |
| C53 | -Cuello uterino | 85 | 33.2 | 26.5 | - | - | - |
| C54 | -Cuerpo uterino | 11 | 4.3 | 3.6 | - | - | - |
| C55 | -Útero sin especificar | 7 | 2.7 | 2.0 | - | - | - |
| C56 | -Ovario | 18 | 7.0 | 5.8 | - | - | - |
| C57 | -Otros órganos genitales femeninos y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C58 | -Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C60-C63 | Órganos genitales masculinos | - | - | - | 128 | 49.7 | 35.3 |
| C60 | -Pene | - | - | - | 4 | 1.6 | 1.2 |
| C61 | -Glándula prostática | - | - | - | 123 | 47.7 | 33.9 |
| C62 | -Testículo | - | - | - | 1 | 0.4 | 0.3 |
| C63 | Órganos genitales masculinos y los no especificados | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 49: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Guantánamo, 2008* (continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|----------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C64-C68 | Tracto urinario | 7 | 2.7 | 2.0 | 14 | 5.4 | 4.3 |
| C64 | -Riñón | 2 | 0.8 | 0.7 | 3 | 1.2 | 0.8 |
| C65 | -Pelvis renal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C66 | -Uréter | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C67 | -Vejiga urinaria | 4 | 1.6 | 1.1 | 10 | 3.9 | 3.3 |
| C68 | -Otros órganos urinarios y los no especificados | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.3 |
| C69-C72 | Encéfalo, ojo, otros SNC | 12 | 4.7 | 4.2 | 3 | 1.2 | 1.2 |
| C69 | -Ojo y anexos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C70 | -Meninges | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C71 | -Encéfalo | 11 | 4.3 | 3.8 | 3 | 1.2 | 1.2 |
| C72 | -Medula espinal-nervios | 1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C73-C75 | Tiroides, y otras glándulas endocrinas | 12 | 4.7 | 3.7 | 4 | 1.6 | 1.3 |
| C73 | -Glándula tiroides | 11 | 4.3 | 3.5 | 1 | 0.4 | 0.3 |
| C74 | -Glándula suprarrenal | 1 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.3 |
| C75 | -Otras glándulas endocrinas | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 0.8 |
| C76 | Sitios mal definidos | 5 | 2.0 | 1.8 | 6 | 2.3 | 1.9 |
| 959-972 | Linfomas total | 2 | 0.8 | 0.6 | 11 | 4.3 | 4.2 |
| 965-966 | - Linfomas Hodgkin | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1.2 | 1.3 |
| 967-972 | - Linfomas no Hodgkin | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1.9 | 1.8 |
| 959 | - Otros sin especificar | 2 | 0.8 | 0.6 | 3 | 1.2 | 1.2 |
| C80 | Sitio primario desconocido | 8 | 3.1 | 2.6 | 6 | 2.3 | 2.1 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 463 | 180.9 | 141.8 | 434 | 168.5 | 132.0 |

*cifras preliminares

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 50: Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Isla de la Juventud, 2008*

| Masculino | | | | |
|-----------|--------------------------|----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C34 | Bronquios y pulmón | 22 | 50.0 | 43.2 |
| C61 | Glándula prostática | 13 | 29.5 | 27.2 |
| C32 | Laringe | 7 | 15.9 | 13.4 |
| C18 | Colon | 7 | 15.9 | 14.4 |
| C16 | Estomago | 6 | 13.6 | 12.1 |
| 980-994 | Leucemias | 5 | 11.4 | 11.9 |
| C44 | Piel | 4 | 9.1 | 5.5 |
| C71 | Encéfalo | 3 | 6.8 | 7.4 |
| C25 | Páncreas | 3 | 6.8 | 5.7 |
| 959-964 | Linfomas | 3 | 6.8 | 6.0 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 91 | 206.8 | 182.8 |

| Femenino | | | | |
|----------|--------------------------|----|-------|--------|
| CIE-03 | Localización | No | TC | T.A.M. |
| C34 | Bronquios y pulmón | 14 | 32.8 | 25.0 |
| C50 | Mama | 11 | 25.8 | 20.1 |
| C53 | Cuello uterino | 8 | 18.8 | 15.0 |
| C44 | Piel | 5 | 11.7 | 8.2 |
| C18 | Colon | 4 | 9.4 | 9.1 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 4 | 9.4 | 9.2 |
| C25 | Páncreas | 3 | 7.0 | 5.7 |
| C54 | Cuerpo uterino | 3 | 7.0 | 5.9 |
| C16 | Estomago | 3 | 7.0 | 5.7 |
| C55 | Útero sin especificar | 2 | 4.7 | 4.4 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 73 | 171.2 | 135.4 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 51: Principales localizaciones de incidencia de cáncer según sexo en los grupos de 15-59 años y 60 años y más. Isla de la Juventud, 2008*

| Masculino | | | | | |
|-----------|--------------------------|-------|------|----------|--------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C34 | Bronquios y pulmón | 4 | 13.3 | 18 | 342.2 |
| C61 | Glándula prostática | 1 | 3.3 | 12 | 228.1 |
| C18 | Colon | 1 | 3.3 | 6 | 114.1 |
| C32 | Laringe | 5 | 16.6 | 2 | 38.0 |
| C16 | Estomago | 2 | 6.6 | 4 | 76.0 |
| C44 | Piel | 2 | 6.6 | 2 | 38.0 |
| 980-994 | Leucemias | 2 | 6.6 | 2 | 38.0 |
| C25 | Páncreas | 1 | 3.3 | 2 | 38.0 |
| 959-964 | Linfomas | 0 | 0.0 | 3 | 57.0 |
| C67 | Vejiga urinaria | 0 | 0.0 | 2 | 38.0 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 27 | 89.7 | 61 | 1159.7 |

| Femenino | | | | | |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------|-------|
| CIE-03 | Localización | 15-59 | | 60 y más | |
| | | No. | tasa | No. | tasa |
| C34 | Bronquios y pulmón | 9 | 30.6 | 5 | 97.7 |
| C50 | Mama | 5 | 17.0 | 6 | 117.2 |
| C53 | Cuello uterino | 4 | 13.6 | 4 | 78.1 |
| C44 | Piel | 3 | 10.2 | 2 | 39.1 |
| C18 | Colon | 0 | 0.0 | 4 | 78.1 |
| C22 | Hígado y conducto biliar | 0 | 0.0 | 4 | 78.1 |
| C25 | Páncreas | 0 | 0.0 | 3 | 58.6 |
| C54 | Cuerpo uterino | 2 | 6.8 | 1 | 19.5 |
| C16 | Estomago | 1 | 3.4 | 2 | 39.1 |
| C55 | Útero sin especificar | 0 | 0.0 | 2 | 39.1 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 34 | 115.5 | 39 | 761.7 |

*cifras preliminares

tasa: tasa específica por edad por 100 000 habitantes

Tabla 52: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Isla de la Juventud, 2008*

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|---------------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C00- C14 | Labio, Cavidad Bucal y Faringe | 1 | 2.3 | 2.1 | 1 | 2.3 | 1.8 |
| C00 | -Labio | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C01 | -Base de la lengua | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C02 | -Otras partes de la lengua | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C03 | -Encía | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C04 | -Piso de la boca | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C05 | -Paladar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C06 | -Otras de la boca | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C07 | -Parótida | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C08 | -Otras glándulas salivales mayores y las no especificadas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C09 | -Amígdala | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1.8 |
| C10 | -Orofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C11 | -Nasofaringe | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C12 | -Seno periforme | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C13 | -Hipofaringe | 1 | 2.3 | 2.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C14 | -Otras cavidad bucal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C15- C26 | Órganos digestivos | 17 | 39.9 | 35.4 | 19 | 43.2 | 37.7 |
| C15 | -Esófago | 2 | 4.7 | 3.8 | 1 | 2.3 | 1.7 |
| C16 | -Estomago | 3 | 7.0 | 5.7 | 6 | 13.6 | 12.1 |
| C17 | -Intestino delgado | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C18 | -Colon | 4 | 9.4 | 9.1 | 7 | 15.9 | 14.4 |
| C19 | -Unión recto-sigmoidea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C20 | -Recto | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 2.1 |
| C21 | -Año y conducto anal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C22 | -Hígado y conducto biliar | 4 | 9.4 | 9.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C23 | -Vesícula biliar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C24 | -Otras partes y las no especificadas de las vías biliares | 1 | 2.3 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2.1 |
| C25 | -Páncreas | 3 | 7.0 | 5.7 | 3 | 6.8 | 5.7 |
| C26 | -Otros sitios y los mal definidos de los órganos digestivos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C30- C39 | Sistema respiratorio y órganos intratorácicos | 15 | 35.2 | 26.9 | 31 | 70.4 | 60.5 |
| C30 | -Cavidad nasal-oído medio | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C31 | -Senos paranasales | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C32 | -Laringe | 1 | 2.3 | 1.9 | 7 | 15.9 | 13.4 |
| C33 | -Tráquea | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C34 | -Bronquios y pulmón | 14 | 32.8 | 25.0 | 22 | 50.0 | 43.2 |
| C37 | -Timo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C38 | -Corazón-mediastino-pleura | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 2.1 |
| C39 | -Otros sistema respiratorio | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 2.1 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 52: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Isla de la Juventud, 2008* (continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|------------------|--|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C40-C41 | Huesos articulaciones y cartílago articular | 1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C40 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de los miembros | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C41 | -Huesos articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y los no especificados | 1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 980-994 | Leucemias | 1 | 2.3 | 1.5 | 5 | 11.4 | 11.9 |
| 9800 | Leucemias sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9801 | Agudas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9800 | Crónicas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9820 | Linfoblásticas sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9821 | Linfoblásticas agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9823 | Linfoblásticas crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9860 | Mieloides sin especificar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9861 | Mieloides agudas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9863 | Mieloides crónicas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9940-9948 | Otras leucemias | 1 | 2.3 | 1.5 | 5 | 11.4 | 11.9 |
| 9732 | Mielomas | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 2.1 |
| C44 | Piel | 5 | 11.7 | 8.2 | 4 | 9.1 | 5.5 |
| C47 | Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C48 | Peritoneo-retroperitoneo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C49 | Tejido conjuntivo subcutáneo y de otros tejidos blandos | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1.5 |
| C50 | Mama | 11 | 25.8 | 20.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C51-C58 | Órganos genitales femeninos. | 15 | 35.2 | 28.5 | - | - | - |
| C51 | -Vulva | 1 | 2.3 | 1.7 | - | - | - |
| C52 | -Vagina | 1 | 2.3 | 1.7 | - | - | - |
| C53 | -Cuello uterino | 8 | 18.8 | 15.0 | - | - | - |
| C54 | -Cuerpo uterino | 3 | 7.0 | 5.9 | - | - | - |
| C55 | -Útero sin especificar | 2 | 4.7 | 4.4 | - | - | - |
| C56 | -Ovario | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C57 | -Otros órganos genitales femeninos y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C58 | -Placenta | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| C60-C63 | Órganos genitales masculinos | - | - | - | 14 | 31.8 | 29.1 |
| C60 | -Pene | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C61 | -Glándula prostática | - | - | - | 13 | 29.5 | 27.2 |
| C62 | -Testículo | - | - | - | 1 | 2.3 | 1.9 |
| C63 | Órganos genitales masculinos y los no especificados | - | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |

*cifras preliminares

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 52: Incidencia de cáncer según sexo y localización. Número de casos, tasas crudas y ajustadas. Isla de la Juventud, 2008* (continuación)

| CIE-03 | Localización | femenino | | | masculino | | |
|----------------|---|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | no | tasa cruda | tasa ajustada | no | tasa cruda | tasa ajustada |
| C64-C68 | Tracto urinario | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 6.8 | 6.1 |
| C64 | -Riñón | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1.7 |
| C65 | -Pelvis renal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C66 | -Uréter | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C67 | -Vejiga urinaria | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 4.5 | 4.4 |
| C68 | -Otros órganos urinarios y los no especificados | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C69-C72 | Encéfalo, ojo, otros SNC | 2 | 4.7 | 1.9 | 4 | 9.1 | 9.0 |
| C69 | -Ojo y anexos | 1 | 2.3 | 0.1 | 1 | 2.3 | 1.7 |
| C70 | -Meninges | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C71 | -Encéfalo | 1 | 2.3 | 1.9 | 3 | 6.8 | 7.4 |
| C72 | -Medula espinal-nervios | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C73-C75 | Tiroides, y otras glándulas endocrinas | 2 | 4.7 | 3.3 | 2 | 4.5 | 6.6 |
| C73 | -Glándula tiroides | 2 | 4.7 | 3.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| C74 | -Glándula suprarrenal | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 4.6 |
| C75 | -Otras glándulas endocrinas | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 2.1 |
| C76 | Sitios mal definidos | 1 | 2.3 | 1.4 | 1 | 2.3 | 2.1 |
| 959-972 | Linfomas total | 2 | 4.7 | 4.1 | 3 | 6.8 | 6.0 |
| 965-966 | - Linfomas Hodgkin | 1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 967-972 | - Linfomas no Hodgkin | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 959 | - Otros sin especificar | 1 | 2.3 | 1.4 | 3 | 6.8 | 6.0 |
| C80 | Sitio primario desconocido | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 4.5 | 3.9 |
| C00-C80 | Todas las localizaciones | 73 | 171.2 | 135.4 | 91 | 206.8 | 182.8 |

*cifras preliminares

SNC: Sistema Nervioso Central

TC: tasa cruda por 100,000. habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Tabla 53: Indicadores de calidad por provincias. Cuba 2008

| PROVINCIAS | 2008 | | | | | |
|---------------------|------|------|-------|------|-----------|------|
| | SCD | | V.H. | | Sin Etapa | |
| | No | % | No | % | No | % |
| Pinar del Rio | 484 | 26.5 | 1339 | 73.5 | 166 | 9.1 |
| Artemisa | 495 | 36.2 | 872 | 63.8 | 107 | 7.8 |
| Mayabeque | 386 | 45.6 | 460 | 54.4 | 58 | 6.9 |
| La Habana | 2443 | 36.0 | 4352 | 64.1 | 451 | 6.6 |
| Matanzas | 640 | 27.8 | 1665 | 72.2 | 251 | 10.9 |
| Villa Clara | 487 | 14.3 | 2911 | 85.7 | 256 | 7.5 |
| Cienfuegos | 349 | 26.8 | 952 | 73.2 | 64 | 4.9 |
| Sancti Spiritus | 360 | 25.6 | 1045 | 74.4 | 65 | 4.6 |
| Ciego de Avila | 305 | 29.5 | 728 | 70.5 | 67 | 6.5 |
| Camagüey | 499 | 22.8 | 1693 | 77.2 | 145 | 6.6 |
| Las Tunas | 487 | 40.3 | 720 | 59.7 | 143 | 11.8 |
| Holguín | 879 | 41.4 | 1246 | 58.6 | 93 | 4.4 |
| Granma | 572 | 31.9 | 1222 | 68.1 | 95 | 5.3 |
| Santiago De Cuba | 490 | 17.6 | 2301 | 82.4 | 425 | 15.2 |
| Guantánamo | 333 | 35.8 | 597 | 64.2 | 55 | 5.9 |
| Isla de la Juventud | 103 | 59.5 | 70 | 40.5 | 8 | 4.6 |
| Cuba | 9312 | 29.6 | 22173 | 70.4 | 2449 | 7.8 |

SCD: reportados solo por certificado de defunción

VH: verificación histológica

Sin etapa: etapa clínica al diagnóstico desconocida

En la tabla 53 se describen los indicadores de calidad por Provincias. Como se puede observar el porcentaje de casos reportados solo por certificado de defunción es elevado y se encuentra por encima del máximo establecido (10%) por lo que este indicador es evaluado de mal. No obstante debemos tener en cuenta que los datos del 2008 son preliminares, lo cual pudiera explicar el incremento en el porcentaje, pero de todas formas evidencias falta de calidad en otros indicadores como la OPORTUNIDA y la INTEGRIDAD.

En cuanto al porcentaje de casos diagnosticados con verificación histológica se observa una mejoría con en el 2008 (70%) con respecto al año 2007 (65%). Este incremento propició que el indicador se categorice como regular.

El porcentaje de casos reportados con etapa clínica desconocida en el momento del diagnóstico, está por encima del estándar establecido en nuestro país por lo que se evaluó de mal.

Al realizar el análisis por provincias, se destaca la provincia de Villa Clara como la de mejores indicadores de calidad de forma global.

Tabla 54: Pronósticos de las principales localizaciones de Incidencia de Cáncer según sexo. Cuba, 2012

| Femenino | | | | Masculino | | | |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------------------------|-------|--------|--------|
| Localización | No | TC | TAM | Localización | No | TC | TAM |
| Pulmón | 1719 | 36,30 | 24,20 | Pulmón | 3216 | 56,08 | 38,14 |
| Mama | 3077 | 54,80 | 36,01 | Próstata | 2836 | 49,54 | 29,26 |
| Cuello de útero | 1489 | 25,57 | 16,63 | Colon | 869 | 15,22 | 9,84 |
| Colon | 1222 | 20,31 | 11,42 | Laringe | 961 | 16,82 | 12,40 |
| Todas las localizaciones | 16435 | 293,12 | 189,91 | Todas las localizaciones | 17566 | 306,34 | 207,65 |

TC: tasa cruda por 100,000 habitantes

TAM: tasa ajustada por edad a la población estándar mundial por 100 000 habitantes

Suplemento.

Distribución espacio temporal de la Incidencia de cáncer en Cuba.

se presentan para el cáncer en todos los sitios y las principales localizaciones de cáncer en Cuba la evolución temporal de las tasas de incidencia desde 1988 hasta 2008, y la distribución geográfica por municipios para el año 2008.

El análisis de la distribución geográfica se realizó mediante la distribución en percentiles de la razón de las tasas ajustadas de cada municipio con relación a la tasa ajustada de Cuba.

Para el análisis de la evolución temporal de las tasas, se utilizó un modelo de regresión loglineal (Joinpoint regression) que permite estimar el porcentaje de cambio anual (PAC) y los puntos de inflexión de las tendencias, si los hubiere.

Gráfico 1: Incidencia por cáncer en todas las localizaciones según sexo. Cuba 1988-2008




Gráfico 2: Distribución geográfica de la incidencia por cáncer en todas las localizaciones. Cuba 2008




Gráfico 3: Incidencia por cáncer de Tráquea, Bronquios y pulmón según sexo. Cuba 1988-2008




Gráfico 4: Distribución geográfica de la incidencia por cáncer de Tráquea, Bronquios y pulmón. Cuba 2008




Gráfico 5: Incidencia por cáncer de mama femenina. Cuba 1988-2008




Gráfico 6: Distribución geográfica de la incidencia por cáncer de mama femenina. Cuba 2008




Gráfico 7: Incidencia de cáncer de Cuello de Útero. Cuba 1988-2008




Gráfico 8: Distribución geográfica de la incidencia por cáncer de cuello de útero. Cuba 2008




Gráfico 9: Incidencia de cáncer de próstata, Cuba 1988-2008




Gráfico 10: Distribución geográfica de la incidencia por cáncer de próstata. Cuba 2008




tabla 55: Porcentaje de cambio anual para las principales localizaciones de incidencia de cáncer en Cuba 1988-2008. Sexo femenino.

| Localización | 1988 | | 2008 | | Período | PCA | IC |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|----------------|
| | No | TAM | No | TAM | | | |
| Cáncer total | 10450 | 157,5 | 14555 | 168,4 | 1988-1996 | -0.75 | (-4.42, 2.27) |
| | | | | | 1997-2008 | 1.05 | (-1.24, 3.33) |
| Pulmón | 942 | 13,8 | 1397 | 15,8 | 1988-1996 | 0.19 | (-0.16, 0.55) |
| | | | | | 1997-2008 | 0.86 | (-0.38, 2.09) |
| Mama | 1923 | 29,8 | 2951 | 34,8 | 1988-1996 | -0.01 | (-1.03, 1.00) |
| | | | | | 1997-2008 | 0.33 | (0.08, 0.58) |
| Cuello de útero | 969 | 15,2 | 1271 | 15,6 | 1988-1996 | -0.31 | (-0.90, 0.28) |
| | | | | | 1997-2008 | -0.14 | (-0.46, 0.18) |
| Colon | 666 | 9,4 | 960 | 9,6 | 1988-1996 | 0.36 | (0.02, 0.69) |
| | | | | | 1997-2008 | 0.26 | (-0.41, -0.12) |

PCA: porcentaje de cambio anual, IC: intervalo de confianza 95%

no: número de casos, TC: tasa cruda por 100 000 habitantes, TAM: tasa ajustada por edad a la población mundial por 100 000 habitantes

tabla 56: Porcentaje de cambio anual de las principales localizaciones de incidencia de cáncer en Cuba 1988-2008. Sexo masculino

| Localización | 1988 | | 2008 | | Período | PCA | IC |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|---------------|
| | No | TAM | No | TAM | | | |
| Cáncer total | 12906 | 177,7 | 15436 | 185,8 | 1988-1996 | 0.34 | (-3.36, 4.05) |
| | | | | | 1997-2008 | 0.33 | (-1.51, 2.19) |
| Pulmón | 2597 | 35,5 | 2554 | 30,8 | 1988-1996 | 0.48 | (-0.57, 1.5) |
| | | | | | 1997-2008 | -0.25 | (-0.83, 0.33) |
| Próstata | 1945 | 23,3 | 2562 | 26,7 | 1988-1996 | 0.89 | (-0.12, 1.89) |
| | | | | | 1997-2008 | 0.01 | (-0.42, 0.44) |
| Colon | 554 | 7,6 | 750 | 8,7 | 1988-1996 | 0.32 | (0.13, 0.52) |
| | | | | | 1997-2008 | -0.04 | (-0.13, 0.05) |

PCA: porcentaje de cambio anual, IC: intervalo de confianza 95%

Referencias

1. Ferlay J, Shin Hai-Rim, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008:GLOBOCAN 2008. *Int. J. Cancer* 2010;127: 2893–2917.
2. GLOBOCAN. Cancer Incidence and mortality World Wide: IARC. *Cáncer Base* no.10 [Internet]. [citado 3 Nov 2011]; [4p.] Disponible en : <http://globocan.iarc.fr/>
3. Anuario Estadístico de Salud. La Habana: Ministerio de Salud Pública de Cuba.. MINSAP;(2011).
4. Galán Y, Fernández L, Torres P, García M. [Trends in Cuba's Cancer Incidence \(1990 to 2003\) and Mortality \(1990 to 2007\)](#). *Medic Review* 2009; 11(3): 19-26.
5. Parkin DM, Hakulinen T, Jensen OM, Parkin DM., Mac Lennan R, Muir CS, and Skeet RG eds. *Cancer Registration. Principles and Methods*. IARC Sci. Publ 1991(95):159-176.
6. Martín A, Galán Y, Rodríguez A, Graupera M, Fernández L. The Cuban National Cancer Registry. *Eur. J. Epid.* 1998;14:287 -97.
7. Fernández L. Sistema de Información para el Registro Nacional del Cáncer [Tesis de candidatura] La Habana: Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología; 1985.
8. Unidad Nacional para el Control del Cáncer. Programa Integral para el Control del Cáncer en Cuba. Manual de Procedimientos del Registro Nacional de Cáncer. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2010.
9. Unidad Nacional para el Control del Cáncer. Programa Integral para el Control del Cáncer en Cuba Pautas para la Gestión 2010. La Habana: Editorial Ciencias Médicas;2010.
10. Oficina Nacional de Estadísticas. Centro de Estudios de Población y Desarrollo. El estado actual y prospectivo de la población cubana: Un reto para el desarrollo territorial sostenible. Edición Diciembre 2008.
11. El Envejecimiento de la Población. Cuba y sus territorios 2010. Centro de Estudios de Población y Desarrollo, CEPDE. Oficina Nacional de Estadísticas; 2010.
12. Barros O. Escenarios demográficos de la población de Cuba para el próximo milenio. La Habana: Centro de Estudios Demográficos; 2000.
13. Rojas F. Situación, sistema y recursos humanos en salud para el desarrollo en Cuba. *Rev Cubana Salud Púb.* 2003;29(2):157-69.